



复方血栓通胶囊应用于眼底病治疗的效果研究

刘 敏

(邵阳市中西医结合医院 眼耳鼻喉科 湖南邵阳 422000)

摘要：目的：探讨复方血栓通胶囊应用于眼底病治疗的临床效果。方法：选取我院2014年8月至2017年5月期间收治的85例眼底病患者的临床资料，按照患者的入院顺序，将其随机分为对照组和观察组。对照组42例患者给予复方丹参片，观察组43例患者给予复方血栓通胶囊治疗。比较两组患者的治疗效果与不良反应发生状况。结果：观察组治疗有效率为93.02% (40/43)，对照组治疗有效率为73.81% (31/42)，差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。两组患者均无不良反应发生。结论：复方血栓通胶囊治疗眼底病的临床效果较好，能够快速改善患者的临床症状，值得进一步推广与应用。

关键词：复方血栓通胶囊；眼底病；效果

中图分类号：R256.12

文献标识码：A

文章编号：1009-5187 (2018) 03-037-01

眼底病是指发生在患者视网膜、眼底血管、视神经乳头、视神经纤维、视网膜上的黄斑部，以及视网膜后的脉络膜等组织的病变[1]。作为临床常见的一种眼科疾病，其发病原因相对复杂，种类多样化，且病情较为反复多变。在临床治疗中，难度较大[2]。同时这类型病变对于患者的视力影响较大。部分患者在发病的过程中，甚至会出现暂时性失明，严重影响其生活质量。目前对于这类疾病的病因尚未完全明确，在治疗时，侧重于以药物来改善患者眼部凝血功能，从而达到活血化瘀的效果，恢复其相关组织功能[3]。但是，眼部神经与生理结构均相对复杂，用药上尤其小心。在临床研究发现，复方血栓通胶囊治疗该种疾病效果较好。故而根据相关资料加以分析。具体报道如下。

1 一般资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2014年8月至2017年5月期间收治的85例眼底病患者的临床资料，将其随机分为对照组和观察组。对照组42例患者中有男22例，女20例，年龄23~78岁，平均年龄(52.31±4.21)岁，病程1个月~6年[6年]，平均病程(3.32±0.31)年；观察组43例患者中有男22例，女21例，年龄21~79岁，平均年龄(51.31±4.98)岁，病程1个月~5[5年]年，平均病程(3.11±0.24)年。其中单眼发病43例，双眼发病42例。纳入标准：(1)本次选取的所有患者均符合临床眼底病的诊断标准[4]；(2)患者对本次研究知情，签署知

情同意书；(3)患者未进行过对应的眼部手术。两组患者一般资料比较，差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。

1.2 方法

对照组患者给予常规治疗。即选取抗血栓药物复方丹参片，观察组患者给予复方血栓通胶囊。均口服，每次3粒，每日3次，分为早、中、晚三次服用。两组患者均连续用药20d。在用药的过程中，可适当的根据其状况来进行维生素补充，以保证治疗效果。同时，需要定期测量患者的视力状况，以确定治疗效果，调整用药。

1.3 评价指标

疗效判定标准 显效：患者各项临床症状消失或者好转，视力提升 ≥ 3 行；有效：患者各项临床症状有所改善，视力提升介于1~3行；无效：患者各项临床症状无变化，甚至恶化。视力状况下降或者不变。

1.4 统计学分析

数据以统计学软件SPSS18.0分析，以($\bar{x} \pm s$)表示计量资料，经t检验；以率(%)表示计数资料，经 χ^2 检验， $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

观察组治疗有效率为93.02% (40/43)，对照组治疗有效率为73.81% (31/42)，差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。两组患者在用药后，均无不良反应发生。详见下表。

表1 观察组与对照组患者治疗效果比较 (n, %)

组别	显效	有效	无效	有效率
观察组 (n=45)	32 (74.42)	8 (18.60)	3 (6.98)	40 (93.02)
对照组 (n=42)	23 (54.76)	8 (19.05)	11 (26.19)	31 (73.81)

3 讨论

随着社会的不断发展，各类电子设备已经成为人们生活与工作中的必需品。而这类设备的长时间使用，会对患者的视力造成较大的影响，这就使得临床眼部疾病发生率提升。尤其是眼底病[眼底病多由于眼部血管微循环不畅，以及新生血管的生成等原因导致。常见继发于高血压、动脉硬化、糖尿病、肾炎、贫血、流感、结核、高度近视及颅内病变等。]。在临床研究发现，眼底病的发生多由于眼部血管微循环不畅，以及新生血管的生成等原因导致。常见继发于高血压、动脉硬化、糖尿病、肾炎、贫血、流感、结核、高度近视及颅内病变等。且根据临床统计显示，在眼部疾病的患者中，有75%以上为眼底病[5]。该类疾病的发生，使得患者视力下降，生活质量严重降低。同时，这类疾病在发病初期的症状相对普遍化，多数患者会将其等同于近视，从而忽略了治疗时机的掌握。随着病程的延长，症状加重，视力下降状况不容忽视，此时患者就医，已经丧失了最佳治疗时机。

复方血栓通胶囊属于中药剂，其中包含了黄芪、玄参、丹参、三七等多种药物，具有补气固表，加强患者免疫力，滋阴去火，清热解毒、改善血液循环，促进组织修复等作用。在使用的过程中，能够有效抑制血小板凝聚，扩张眼部血管，促进眼部组织恢复，从而达到治疗的效果。常规的抗血栓药物复方丹参片虽然能够起到扩张血管、活

化瘀散的效果，倒是无法对患者体内的湿热进行去除，从而导致用药反复性较强，治疗效果受限。无论是患者体验还是治疗效果都会受到较大的影响。在本次研究中，观察组治疗有效率明显高于对照组，且两组患者在用药后，均无不良反应发生，就可以看出该种治疗方案的优势，且治疗安全性也相对较好。

综上所述，复方血栓通胶囊治疗眼底病的临床效果较好，能够快速改善患者的临床症状，值得进一步推广与应用。

参考文献：

- [1]朱向红.观察复方血栓通胶囊治疗眼底病的临床效果[J].中国现代药物应用,2016,10(09):189-190.
- [2]吴楠.复方血栓通胶囊治疗眼底病的疗效观察[J].临床医学,2015,35(11):58-59.
- [3]孟玉霞.复方血栓通胶囊治疗眼底病的临床分析[J].中国医药指南,2015,13(04):229-230.
- [4]冯小成,温志雄,潘武明,谢建荣,郭梨.复方血栓通胶囊治疗眼底病临床研究[J].亚太传统医药,2014,10(22):118-119.
- [5]刘吉宇.复方血栓通胶囊治疗眼底病的临床效果[J].中国处方药,2014,12(03):48-49.