



老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎应用荆花胃康胶丸联合三联疗法治疗的效果分析

张 沁

(湖南省株洲市茶陵县中医院 412400)

摘要：目的：分析老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎应用荆花胃康胶丸联合三联疗法治疗的临床效果。方法：本次研究对象选择我院在2016年1月~2017年12月接治治疗的114例老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎患者，将114例患者通过抽签法平均分为57例参照组（接受常规三联法治疗）与57例实验组（荆花胃康胶丸联合三联法治疗），比较两组患者不良反应发生率及治疗总有效率。结果：实验组患者不良反应发生率为5.26%，参照组患者不良反应发生率为21.05%，组间差异明显， $P < 0.05$ ，存在统计学意义；实验组患者治疗总有效率为94.73%，参照组患者治疗总有效率为70.17%，组间差异明显，参照组患者治疗总有效率为%，组间差异明显， $P < 0.05$ ，存在统计学意义。结论：老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎应用荆花胃康胶丸联合三联法治疗，不仅可以有效改善患者临床病症，同时可降低不良反应发生率，安全可靠，因此，值得临床应用并推广。

关键词：老年；幽门螺杆菌感染慢性胃炎；荆花胃康胶丸；三联疗法

中图分类号：R256.12

文献标识码：A

文章编号：1009-5187 (2018) 06-129-01

本次选择我院接治治疗的114例老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎患者，分析老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎应用荆花胃康胶丸联合三联法治疗的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般临床资料

本次研究对象选择我院在2016年1月~2017年12月接治治疗的114例老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎患者，将114例患者通过抽签法平均分为57例参照组（接受常规三联法治疗）与57例实验组（荆花胃康胶丸联合三联法治疗），比较两组患者不良反应发生率及治疗总有效率。

参照组患者中病程为2~20年，平均病程（ 8.6 ± 1.3 ）年；最大年龄为84岁，最小年龄为65岁，平均年龄为（ 72.3 ± 0.5 ）岁；女性27例，男性30例。

实验组患者中病程为2~21年，平均病程（ 9.6 ± 1.3 ）年；最大年龄为83岁，最小年龄为65岁，平均年龄为（ 71.3 ± 0.5 ）岁；女性26例，男性31例。

实验组与参照组在一般资料中未出现差异， $P > 0.05$ ，不存在统计学意义，可对比。

1.2 方法

1.2.1 三联法治疗

57例参照组患者接受三联法治疗，具体方法为：对患者给予克拉霉素、阿莫西林、兰索拉唑治疗，用量用法依次为：三种药物均口服，克拉霉素一日两次，一次500mg；阿莫西林一日两次，一次1000mg；兰索拉唑一日两次，一次30mg。持续治疗30d。

1.2.2 联合荆花胃康胶丸治疗

57例实验组患者在参照组治疗基础上联合荆花胃康胶丸治疗，具体方法为：对患者给予荆花胃康胶丸治疗，一日两次，一次160mg。持续治疗30d。

1.3 评定指标

观察两组患者恶心呕吐、头晕等不良反应发生率及总有效率。总有效率等于有效率加上显效率。

无效标准：患者治疗后，幽门螺杆菌检测结果为阳性，纳差、嗝气等临床症状未改善。

有效标准：患者治疗后，幽门螺杆菌检测结果显示为逐渐转阴，临床症状逐渐消失。

显效标准：患者治疗后，幽门螺杆菌检测结果阴性，临床症状全部消失。

1.4 统计学分析

使用SPSS20.0软件对114例老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎患者的指标数据进行分析，卡方检验，以%形式展开患者不良反应发生率及治疗总有效率，两组患者组间差异存在统计学意义以 $P < 0.05$ 展开。

2 结果

2.1 对比两组患者不良反应发生率

实验组患者不良反应发生率为5.26%，参照组患者不良反应发生率为21.05%，组间差异明显， $P < 0.05$ ，存在统计学意义，详见表1。

表1 对比两组患者不良反应发生率{例(%)}

组别	例数	恶心呕吐	头晕	不良反应发生率
参照组	57	5	7	21.05
实验组	57	1	2	5.26
X ²				6.2182
P				<0.05

2.2 对比两组患者治疗总有效率

实验组患者治疗总有效率为94.73%，参照组患者治疗总有效率为70.17%，组间差异明显， $P < 0.05$ ，存在统计学意义，详见表2。

表2 对比两组患者治疗总有效率{例(%)}

组别	例数	无效	有效	显效	总有效率
参照组	57	17	25	15	70.17
实验组	57	3	34	20	94.73
X ²					11.8851
P					<0.05

3 讨论

一般情况下临床常采用三联法或四联法治疗幽门螺杆菌感染慢性胃炎，但老年患者因身体各项机能下降，再加上老年患者均存在不同程度的其他疾病，进而使得药物费用及不良反应发生率逐步增高，严重影响患者预后。荆花胃康胶丸为复方药剂，由土荆芥、水团花构成，其中土荆芥可起到除寒驱邪、散寒理器的作用，水团花就不谈止生肌、清热利湿、活血化瘀的功效，该药物在幽门螺杆菌感染慢性胃炎中应用可以增强患者胃动力、降低胃蛋白酶活性、促进胃排空、抑制胃酸分泌，进而有效改善患者临床病症[1-5]。基于此，本次选择我院接治治疗的114例老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎患者，分析老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎应用荆花胃康胶丸联合三联法治疗的临床效果，通过本组研究结果显示，实验组患者不良反应发生率为5.26%，参照组患者不良反应发生率为21.05%，组间差异明显， $P < 0.05$ ，存在统计学意义；实验组患者治疗总有效率为94.73%，参照组患者治疗总有效率为70.17%，组间差异明显，参照组患者治疗总有效率为%，组间差异明显， $P < 0.05$ ，存在统计学意义。

综上所述，老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎应用荆花胃康胶丸联合三联法治疗，不仅可以有效改善患者临床病症，同时可降低不良反应发生率，安全可靠，因此，值得临床应用并推广。

参考文献：

- [1] 李达祥.荆花胃康胶丸治疗老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎效果及HP根除率[J].中国医药科学,2015(11):51-53.
- [2] 狄艳琴,关晓清.荆花胃康胶丸治疗老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎效果及HP根除率[J].中国卫生标准管理,2017(26):108-109.
- [3] 姜梅芳.荆花胃康胶丸联合三联法治疗老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎的疗效[J].中国老年学杂志,2014(10):2719-2720.
- [4] 裴英,阿衣木古力托乎提.荆花胃康胶丸联合三联法治疗老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎效果探讨[J].临床研究,2015(12):10-11.
- [5] 龙飞.荆花胃康胶丸联合三联法治疗老年幽门螺杆菌感染慢性胃炎60例[J].广西中医药,2016(5):28-29.