



• 护理研究 •

康复新液在输液外渗性皮下红肿护理中的应用

林楚芳

(中国人民解放军第一七五医院 厦门大学附属东南医院消化科 福建漳州 363000)

摘要:目的 通过对康复新液在输液外渗性皮下红肿患者护理中的应用进行分析,探究其临床效果。方法 选取于2017年1月至2018年1月期间,将本院门诊消化内镜室和消化内科病区接受输液引起外渗性皮下红肿的患者48例作为研究对象,并随机按照1:1的方式把48例患者分成观察组和对照组。对照组给予硫酸镁湿敷,观察组用康复新液。比较两组患者的治疗效果。结果 观察组的各项观察指标优于对照组,故用康复新液治疗静脉输液外渗性皮下红肿效果明显。结论 对输液外渗性皮下红肿使用康复新液治疗护理后,能促进修复,减少并发症的发生,值得推广使用。

关键词: 输液外渗性红肿; 康复新液; 护理

中图分类号: R256.12

文献标识码: A

文章编号: 1009-5187 (2018) 16-102-01

静脉输液外渗是临床静脉输液常见的并发症之一,因其可能引起深部组织损伤甚至溃疡、瘢痕挛缩及筋膜间隔综合征等严重并发症,因此是护理工作中的一个难题针对输液外渗性皮下水泡的治疗目前公认的药物一是康复新液:

康复新液具有散瘀活血、养阴生肌的作用。药理作用:①修复各类溃疡及创伤创面。②抗炎、消除炎性水肿。③提高机体免疫功能,调节机体的生理平衡。根据对输液外渗性皮下红肿的治疗护理总结和分析,报告如下:

1 临床资料

1.1 一般资料。选取于2016年1月至2018年1月期间,在本院消化内科接受输液外渗性皮下红肿的患者48例作为研究对象,并随机按照1:1的方式把48例患者分成观察组和对照组,每组24例。对照组给予硫酸镁湿敷,观察组用康复新液。

1.2 护理方法。对照组:在无菌操作下,予静脉输液外渗处皮肤用碘伏消毒,再用无菌生理盐水棉球轻擦洗,然后将备好的纱布浸于硫酸镁溶液中,将浸有硫酸镁溶液的纱布平铺于静脉输液外渗处,一日三次换。以保持纱布有充足的药液成分,避免水温过低纱布上产生少量的晶体而影响疗效。观察组:同样予静脉输液外渗处皮肤用碘伏消毒,再用无菌生理盐水棉球轻擦洗,然后用康复新液浸湿的无菌纱布覆盖,待干后拆掉纱布,一日三次换。

2 统计学方法

采用SPSS统计学软件对本次研究中的数据进行统计分析, $P < 0.05$ 时视为有统计学意义。

3 结论

3.1 我国临床主要是以硫酸镁局部外敷治疗为主。硫酸镁湿敷是利用其高渗作用,促进局部红肿消退的作用,从而达到消炎、止痛、消肿的目的,但是在临床使用中发现其作用时间短,需反复操作,增加了护理人员的工作量。使用纱布湿敷,水分蒸发快,硫酸镁很快析出结晶,使纱布干燥、变硬,不易贴紧皮肤,从而影响药物吸收,影响其疗效。另外湿敷易浸湿床单、被套及衣裤,临床使用不方便,对疼痛的患者使用外敷硫酸镁症状缓解不明显,容易引起护患纠纷。

3.2 中医认为:气血不畅,津液分布受阻则肿胀;瘀血内蕴,蕴久化热,脉络损伤,血溢肌肤或血热内蕴则局部红肿,而康复新液是根据云南大理白族人民应用蜚蠊治疗恶创的有效经验,运用现代科学技术从蜚蠊昆虫美洲大蠊的干燥虫体提取物中分离、精制而成的生物制剂,具有清热燥湿、活血消肿之功效。

3.3 从本研究结果显示:应用康复新液治疗静脉输液外渗临床效果明显优于硫酸镁治疗,使用方便简单易行,药物易于吸收,见效快,对皮肤无刺激患者容易接受,值得临床推广使用。以下图片是药液外渗导致皮下红肿使用康复新液湿敷前后对比图。



使用前: 红肿渗出明显



康复新湿敷方法



使用3天后效果明显

参考文献:

- [1] 吴安华, 任南, 文细毛, 等. 156家医院住院患者静脉输液的流行病学调查[J]. 中华流行病学杂志, 2004, 25 (10): 916-917.
- [2] 詹琳清. 新鲜马铃薯外敷治疗药物渗出性组织损伤的研究[J]. 中国实用护理杂志, 2005, 21 (10): 4-5.
- [3] 赵永新. 静脉输液可能引发的医患纠纷及防范措施[J]. 中国医药学杂志, 2005, 25 (12): 1170-1172.
- [4] 陈新谦, 金有豫. 新编药理学[M], 第14版. 北京: 人民卫生出版社[M], 2002: 88.
- [5] 姚秀琴, 赵海剑. 康复新液在放疗后皮肤黏膜损伤护理中的应用. 南方护理学报, 2002, 9 (6): 6.