

人文关怀在脑梗死患者高压氧舱康复治疗中的应用

何 燕

江油市人民医院 621700

【摘要】目的 探讨脑梗死患者高压氧舱康复治疗中人文关怀的应用效果。**方法** 选取 2018 年 3 月-2019 年 3 月我院收治的采用高压氧舱康复治疗的 40 例脑梗死患者纳入本次研究, 对照组 (n=20) 的护理方法为常规护理、观察组 (n=20) 采用人文关怀护理, 比较临床效果。**结果** 观察组护理满意度 100.00%、对照组 70.00% ($P < 0.05$)。**结论** 在高压氧舱康复治疗的基础上应用人文关怀护理, 能够提高脑梗死患者的临床配合程度, 从而提高治疗效果。

【关键词】 脑梗死; 高压氧舱康复治疗; 人文关怀; 应用效果

【中图分类号】 R473.74 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 2095-7165 (2019) 03-134-01

高压氧舱是治疗脑梗死患者的重要手段^[1], 但治疗过程中, 患者普遍存在各种负性情绪, 配合程度较差。本研究比较了常规护理与人文关怀护理在脑梗死患者中的应用效果, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料

参与研究的 40 例脑梗死患者全部选自 2018 年 3 月-2019 年 3 月, 其中对照组 20 例, 男性 13 例、女性 7 例; 年龄 58-84 岁, 平均年龄 (68.54±1.17) 岁。观察组 20 例, 男性 12 例、女性 8 例; 年龄 56-83 岁, 平均年龄 (67.98±1.06) 岁。两组患者的个人资料比较, 差异没有统计学意义 ($P > 0.05$)。

1.2 方法

常规护理: 密切监测患者的生命指标。

人文关怀: 讲解高压氧舱康复治疗的相关知识和优势; 观察仪器参数的变化情况、患者的吸氧情况, 吸氧结束后, 指导患者减压, 调整耳压。出舱后, 帮助患者穿戴衣物, 陪伴其回到普通病房。

1.3 观察评定标准

采用填写问卷的方式调查两组患者的护理满意度, 总分 100

分, 评分 > 90 分表示非常满意、70-90 分为比较满意、< 70 分代表不满意。总满意度 = 非常满意率 + 比较满意率。

1.4 统计学方法

本研究应用 SPSS19.0 统计学软件进行处理, 计量资料以 ($\bar{x} \pm s$) 表示, 组间比较采用 t 检验, 计数资料以率 (%) 表示, 组间比较进行 χ^2 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

两组患者的护理满意度比较, 观察组中, 15 例 (75.00%) 非常满意、5 例 (25.00%) 比较满意, 总满意度 100.00%。对照组中, 非常满意 6 例 (30.00%)、比较满意 8 例 (40.00%)、不满意 6 例 (30.00%), 总满意度 70.00%。差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。

3 讨论

人文关怀是一种以尊重人格、尊严、生命为宗旨的护理模式, 满足了患者精神和心理的需求, 在高压氧舱康复治疗的脑梗死患者中具有良好的应用效果, 建议采纳。

【参考文献】

[1] 何红兵, 马伟东. 人文关怀在老年性脑梗死患者高压氧舱康复治疗中的应用效果分析 [J]. 心理医生, 2017, 23(21):344-345.

(上接第 132 页)

综上所述, 糖尿病足护理中持续护理质量改进的应用, 能够明显改善护理效果, 提高患者的临床疗效与生活质量, 具备较强的临床使用价值, 值得推广。

【参考文献】

[1] 栗静. 不同护理措施对糖尿病足患者的护理效果分析 [J].

当代护士: 学术版 (中旬刊), 2018, 25(11):29-31.

[2] 刘华荣. 持续性护理质量控制应用于住院糖尿病患者发生压疮的效果分析 [J]. 糖尿病新世界, 2016, 19(24):143-144.

[3] 高红鹰, 邹菁, 田坤, 等. 护理干预在老年糖尿病足患者治疗中的临床应用 [J]. 中国煤炭工业医学杂志, 2016, 19(11):1639-1642.

(上接第 133 页)

等方式。由于临时插管的滞留时间较长, 导致患者易发生感染并发症, 严重影响患者的身体健康和生命质量。有研究显示, 在接受血液净化治疗的患者中, 发生感染并发症的患者占比在 10% 以上^[3]。在此情况下, 对接受血液净化治疗的患者在颈内静脉导管术操作期间实施全方位护理, 通过心理护理、健康宣教和并发症护理等综合性措施, 不仅能够缓解患者在治疗期间出现的不良情绪, 改善患者不良的生活习惯, 在降低感染和脱管等并发症方面, 也有明显的应用效果。在本文研究结果中, 对接受血液净化治疗的患者在颈内静脉导管术操作期间实施全方位护理的观察组, 感染发生率为 5%、护理满意度为 92.5%, 显著优于对照组的 25% 和 67.5%, 差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。由此可见, 应用全面护

理模式对接受血液净化治疗的患者在颈内静脉导管术操作期间实施护理, 感染等并发症发生率较低, 且能够有效提高患者的护理满意度, 在临床上值得推广和应用。

【参考文献】

[1] 唐海燕. 临床护理路径对预防血液净化患者深静脉导管感染的应用效果 [J]. 实用临床护理学电子杂志, 2018, 3(31):116+122.

[2] 孙凌, 梁莱兴, 尤晓玲, 等. 两种不同压迫止血方式在血液透析患者颈内静脉导管护理中的应用效果对比 [J]. 广西医学, 2018, 40(1):109-111.

[3] 马慧, 韩玲. 预见性护理在预防血液净化导管相关性血流感染中的应用 [J]. 实用临床医药杂志, 2018, 22(12):30-33.