

产房护理安全管理在产妇分娩中的应用效果探讨

覃芳莲

容县人民医院 广西容县 537500

【摘要】目的 探讨产房护理安全管理在产妇分娩中的应用效果。**方法** 选取2018年7月至2019年7月在我院进行分娩的120例产妇作为研究对象,均等分为两组,每组各60例;对照组产妇给予常规护理干预,研究组产妇给予产房护理安全管理,对比两组产妇的难产率、护理满意度、分娩产程及方式。**结果** 研究组难产率6.67%显著低于对照组18.33%,研究组护理满意度达到96.67%,比对照组78.33%的护理满意度要高很多;研究组产妇在经过针对性护理后的分娩第一、二、三产程时间均要显著短于对照组,研究组自然分娩率达到80.00%,与对照组的66.67%形成较大落差。两组所有数据差异均具有统计学意义($P<0.05$)。**结论** 产房护理安全管理可有效降低产妇难产率,缩短产程,提高产妇分娩过程中的护理满意度,保证产妇和新生儿的健康,具有极高的临床应用价值。

【关键词】 产房护理;安全管理;产妇分娩;应用效果

【中图分类号】 R473.71

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2020) 02-132-02

孕妇分娩过程伴随着很多风险因素,如果预防及护理不到位有可能导致不良事件发生,给产妇及胎儿造成极其不利的影响,甚至威胁母婴生命安全^[1]。作为医院的高风险科室,产科医护人员承担着十分重大的职责。随着我国经济条件以及医疗卫生条件的提升,人们对于产房的安全护理管理越来越重视。有效的护理安全管理对于提高临床护理质量、减少医疗纠纷、保证产妇及新生儿健康具有重要意义。为进一步明确产房安全护理在产妇分娩中的应用效果,本文选取我院分娩的120例产妇作为研究对象,展开分组研究,现将研究结果详细报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年7月至2019年7月在我院进行分娩的120例产妇作为研究对象,均等分为两组,每组60例:对照组产妇年龄23至35岁,平均 (28.96 ± 2.13) 岁;孕周35至40周,平均 (40.10 ± 0.50) 周。对照组产妇年龄24至32岁,平均 (28.30 ± 2.64) 岁;孕周36至41周,平均 (41.20 ± 0.70) 周。两组120例产妇均为初产妇,所有产妇胎儿情况良好,胎位正常。120例产妇均在我院进行产检并接受分娩手术,排除高龄产妇、患有其他妊娠疾病、存在语言听力障碍及精神疾病产妇。两组产妇年龄、孕周等基本资料对比无显著差异,具有可比性($P>0.05$)。

1.2 护理方法

产妇在分娩过程中均给予常规护理干预,主要包括对产妇及胎儿做好监测,指导患者注意饮食及保持充足的睡眠,以确保生产过程中拥有充足体力支持自然分娩。研究组产妇在此基础上给予产房护理安全管理,在产妇分娩时采用PDCA循环护理管理模式,具体操作如下:(1)护理资料准备。对我院近几年的生产案例进行搜集与整理,根据整理的这些案例分析产妇生产过程中可能出现的一些风险因素,这些因素将成为下一步针对性护理预防方案的设计依据。(2)护理方案设计。成立护理专业小组,依据前面分析的分娩风险因素,护理小组针对性设计相关的安全防范计划,根据计划逐一排查研究对象存在的一些安全隐患。建立完善的安全防范绩效考核评价体系,将风险护理管理与医护人员的个人经济利益直接挂钩,以此提升医护人员的工作积极程度。另外,加强

对护理人员的技能培训,不断提升护理人员的专业能力。对于刚进院的医护人员更要加强其健康宣教的能力,将护理人员的耐心提升放在第一位,注意提升护理人员对于产妇个人信息保护的意识。(3)实施计划。完成各项准备工作后,按照先前制定的方案逐步落实护理计划,规范开展各项护理操作,注重提升医护人员的个人素养。(4)核查护理结果。认真分析护理防范计划,总结计划实施结果。找出计划实施过程中存在的不足,依据此次评估结果不断加以改进,持续提升产房护理安全管理质量。

1.3 观察指标

对产妇生产过程的分娩方式、分娩用时以及难产情况进行严密监测,并做好记录^[2]。发放我院自制的护理满意度调查表由产妇及家属共同填写,统计两组产妇的总护理满意度,对比护理满意度。

1.4 统计学处理

应用统计学软件SPSS24.0进行数据的统计学分析与处理,计量资料以 $(\bar{x}\pm s)$ 表示,行t检验组间差异,计数资料用n(%)表示,行 χ^2 检验组间差异, $P<0.05$ 表示试验结果差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组产妇难产率及护理满意度比较

研究组难产率6.67%显著低于对照组18.33%($P<0.05$);研究组护理满意度96.67%显著高于对照组78.33%($P<0.05$)。详见表1。

表1: 研究组与对照组难产率及满意度对比[n(%)]

组别	例数	难产率	满意度
研究组	60	4 (6.67)	58 (96.67)
对照组	60	11 (18.33)	47 (78.33)
χ^2		6.528	6.215
P		0.022	0.037

2.2 两组产妇分娩产程比较

研究组产妇的分娩第一、第二、第三产程的时间均要显著短于对照组,差异存在统计学意义($P<0.05$)。详见表2。

2.3 两组产妇自然分娩率及剖宫产率比较

研究组自然分娩48例,剖宫产12例,对照组自然分娩40例,剖宫产20例。剖宫产率20.00%显著低于对照组

33.33%, 差异显著 ($P=0.035$, $\chi^2=6.849$)。

表 2: 观察组与对照组产妇分娩产程时间对比 ($\bar{x} \pm s$, h)

组别	例数	第一产程	第二产程	第三产程
研究组	60	8.13 $\pm$ 1.64	40.26 $\pm$ 10.35	3.98 $\pm$ 0.96
对照组	60	10.37 $\pm$ 2.05	57.93 $\pm$ 11.85	7.41 $\pm$ 0.52
t		7.624	6.528	7.527
P		0.021	0.032	0.023

3 讨论

如果一个医院的产科产房缺乏完善、规范的的安全管理制度,护理人员无法可依,势必无法保证护理工作质量,无法保障产妇及婴儿的安全;产房管理人员的专业能力不足,护理人员责任心不强、助产护士未能严格按照规定要求执行各项操作等,都会在很大程度上增加产房护理风险^[3]。分娩是一个存在较大变化的过程,若医护人员应对突发事件的专业能力不够,生产过程的不良事件发生情况有可能就会增多。同时,如果护理人员的沟通不及时,不积极履行健康宣教与告知义务等,不仅会导致护理风险因素增多,还会影响护患关系,诱发医疗纠纷。

护理安全管理是通过识别、分析与评价潜在的护理安全风险,有计划的实施消除对策,从而将安全事故的发生几率降到最低。本次研究中,最终临床效果对比,研究组难产率显著低于对照组,研究组护理满意度显著高于对照组,研究组产妇的分娩第一、二、三产程时间均显著短于对照组,研究组自然分娩率显著高于对照组。

综上所述,产房护理安全管理可有效缩短产妇的产程,提高自然分娩的成功率,降低难产等不良安全事件的发生几率。因此,产科医护人员必须不断提高自身的专业技术能力与服务水平,加强对产房护理安全管理制度的规范与推广执行。

参考文献:

- [1] 李冬梅.探讨产房护理安全管理在产妇产分娩中的临床效果[J].数理医药学杂志,2018,31(05):781-782.
- [2] 毛佳慧,徐芬,陈贵君.新产程标准在初产妇潜伏期活动管理与分娩体验中的应用效果[J].中华现代护理杂志,2017,23(9):1235.
- [3] 马文森.产房护理安全管理在产妇产分娩中的应用分析[J].中国城乡企业卫生,2018,33(09):101-102.

(上接第 129 页)

老年带状疱疹后遗留神经痛患者实施健康教育可纠正患者、患者家属疾病错误认知,心理护理干预有利于降低患者对诊疗护理干预的恐惧,从而提升患者对临床诊疗护理的配合程度与积极性^[4]。本次研究显示实验组患者护理干预后 SCL-90 量表得分对照组低,ESCA 量表得分比对照组高,且实验组患者干预 1 个月后总有效率为 96.30%,明显高于对照组。

综上所述,对于老年带状疱疹后遗神经痛患者健康教育和心理护理干预的实施可有效改善患者负面心理情绪状态,提升患者自我护理能力,有利于患者临床症状的缓解。

参考文献:

- [1] 沈秀玲.健康教育和心理护理对改善老年带状疱疹后遗神经痛患者生活质量的作用[J].中国保健营养,2019,29(7):247.
- [2] 张志英.健康教育和心理护理对改善老年带状疱疹后遗神经痛患者生活质量的价值分析[J].养生保健指南,2017,1(2):62.
- [3] 刘海燕.健康教育和心理护理对改善老年带状疱疹后遗神经痛患者生活质量的作用[J].中国医学创新,2016,13(24):70-73.

(上接第 130 页)

由以上结果描述可知,观察组患者治疗总有效率为 100%,其中,满意、基本满意、不满意对应人数分别为 18 例、4 例、0 例,与常规护理下的对照组(77.27%)相比较,组间差值具有可比性($P<0.05$)。由此可见,在耳专科病房护理工作中精细化管理的应用价值较高,适宜推广。

参考文献:

- [1] 徐春丽.精细化管理在神经内科护理管理中的应用效果[J].医疗装备,2015,28(18):190-191.
- [2] 周守志,尹弘青,汪强,金学勤,钟绍,陶娟,樊小鹏,刘士方.精细化管理结合分区管理在急诊质量管理中的实践与效果[J].江苏卫生事业管理,2019,30(06):736-740.
- [3] 刘淑娥.精细化管理在病房护理安全管理中的应用效果观察[J].世界最新医学信息文摘,2016,16(A1):255+259.

(上接第 131 页)

施细致护理,能够有效提高护理效果,降低并发症发病率,提高急诊 ICU 患者的治疗和护理安全性,提高患者护理满意度,促进患者预后。

参考文献:

- [1] 张春仙.急诊 ICU 气管插管机械通气患者的观察与护理[J].养生保健指南,2018,(37):126.
- [2] 郑婷,罗秋琼.急诊 ICU 气管插管机械通气患者的观察与护理[J].中国医药科学,2018,8(2):120-122.

[3] 崔梅,柳小霞.对接受气管插管机械通气的患者进行不同频率的口腔护理在降低其 VAP 发生率方面的效果[J].当代医药论丛,2018,16(24):222-223.

[4] 杨静莉.预见性护理配合药物镇静对降低 ICU 气管插管患者非计划性拔管率的疗效分析[J].饮食保健,2019,6(6):196-197.

[5] 熊勤林,罗秀华,罗艳.预见性护理配合药物镇静对降低 ICU 气管插管患者非计划性拔管率的效果分析[J].当代医学,2018,24(6):158-159.