

观察安全隐患自查模式在手术室护理风险管理中的应用效果

左洁洁

上海长征医院 上海 200003

[摘要] 目的 讨论观察安全隐患自查模式在手术室护理风险管理中的应用效果。方法 我院选取 80 例实行手术治疗的患者，根据随机数字法分为两组，在实验组中使用安全隐患自查模式，在对照组中不做干预。结果 对照组的风险事件发生率为 17.50%，实验组的风险事件发生率为 5.00%，差别较大 ($P < 0.05$)。对照组的护理投诉高于实验组，差别较大 ($P < 0.05$)。对照组中有 7 例患者不满意，有 11 例患者满意，有 22 例患者非常满意。实验组中有 1 例患者不满意，有 10 例患者满意，有 29 例患者非常满意。两组比较差别较大 ($P < 0.05$)。结论 在实行手术的患者中使用安全隐患自查模式，可以提高患者的护理满意率，减少护理风险事件以及护理投诉的发生，具有重要的临床价值。

[关键词] 安全隐患自查模式；手术室护理风险管理；应用效果

[中图分类号] R472.3

[文献标识码] A

[文章编号] 2095-7165 (2020) 06-137-01

手术治疗是一种有效的治疗疾病的方法，属于侵入性操作。在手术治疗过程中具有一定的安全隐患以及护理风险^[1]。在手术室护理风险管理中使用安全隐患自查模式，可以提高手术安全性，减少风险事件发生，提高患者满意率^[2]。本文中我院选取 80 例实行手术治疗的患者，根据随机数字法分为两组，在实验组中使用安全隐患自查模式，在对照组中不做干预，具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

我院选取 80 例实行手术治疗的患者，根据随机数字法分为两组，在实验组中使用安全隐患自查模式，在对照组中不做干预。其中，实验组患者有女性 16 例，男性 24 例，平均年龄为 42.9 岁。对照组患者有女性 20 例，男性 20 例，平均年龄为 43.1 岁。

1.2 方法

在对照组中不做干预，根据常规手术室护理管理进行，护理人员根据规章制度进行手术护理。在实验组中使用安全隐患自查模式。

(1) 护理人员成立安全隐患自查小组，根据手术室的实际情况，进行合理的分工，将护理工作的责任明确，并根据找出的安全隐患制定合适的措施，安排护理人员进行检测以及落实。(2) 自查小组每周进行一次例会，阐述上周护理工作中出现安全隐患的情况，并制定合适的护理措施。(3) 护理人员严格根据规章制度进行护理，对各种手术室的医疗器械进行严格消毒，灭菌，并进行定期检测，维修，保证手术中器械能够正常使用。在手术前，仔细核对患者的身份信息，比如腕带标识，基本资料，手术标识，病历资料等，防止出现差错。(4) 在手术中，护理人员需要关注患者的病情变化以及手术进程的情况，配合医生进行手术，并准备好药物以及器械，在手术后将手术使用的器械，药物进行清点和整理，防止出现遗漏的情况。

1.3 统计学方法

使用 SPSS22.0 软件分析统计本文中出现的数据，其中计量资料，实行 T 检验；计数资料，实行卡方进行检测。在 $P < 0.05$ ，差别较大。

2 结果

2.1 实验组和对照组的风险事件发生以及护理投诉的情况

对照组的风险事件发生率为 17.50%，实验组的风险事件发生率为 5.00%，差别较大 ($P < 0.05$)。对照组的护理投诉高于实验组，差别较大 ($P < 0.05$)。

表 1：实验组和对照组的风险事件发生以及护理投诉的情况

组别	例数	风险事件发生	护理投诉
实验组	40	2 (5.00%)	1 (2.50%)
对照组	40	7 (17.50%)	6 (15.00%)
χ^2 值		7.152	8.322
P 值		< 0.05	< 0.05

2.2 实验组和对照组的护理满意率的情况

对照组中有 7 例患者不满意，有 11 例患者满意，有 22 例患者非常满意。实验组中有 1 例患者不满意，有 10 例患者满意，有 29 例患者非常满意。两组比较差别较大 ($P < 0.05$)。

表 2：实验组和对照组的护理满意率的情况

组别	例数	非常满意	满意	不满意	总满意率
实验组	40	29 (72.50%)	10 (25.00%)	1 (2.50%)	97.50%
对照组	40	22 (55.00%)	11 (27.50%)	7 (17.50%)	82.50%
χ^2 值		7.832	4.253	7.172	8.352
P 值		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05

3 讨论

手术是一种临幊上常见的治疗方法，手术治疗是一种侵入性治疗，如果在手术中出现异常的情况，不仅会影响手术效果，还会威胁患者的生命安全^[3]。在实行手术的患者中使用安全隐患自查模式，可以最大限度的减少护理风险事件发生^[4]。通过对护理人员进行培训，提高护理人员的专业水平，提高风险意识，将护理工作的责任明确，并根据找出的安全隐患制定合适的措施，安排护理人员进行检测以及落实。

本文中我院选取 40 例实行手术治疗的患者使用安全隐患自查模式，选取 40 例实行手术治疗的患者不做干预。根据研究发现，不做干预组的风险事件发生率为 17.50%，使用安全隐患自查模式组的风险事件发生率为 5.00%，差别较大 ($P < 0.05$)。不做干预组的护理投诉高于使用安全隐患自查模式组，差别较大 ($P < 0.05$)。不做干预组中有 7 例患者不满意，有 11 例患者满意，有 22 例患者非常满意。使用安全隐患自查模式组中有 1 例患者不满意，有 10 例患者满意，有 29 例患者非常满意。两组比较差别较大 ($P < 0.05$)。李卓瑶等^[5]研究的安全隐患自查模式在耳鼻喉手术室护理风险管理中的应用效果中结果与本文相似。

综上，在实行手术的患者中使用安全隐患自查模式，可以提高患者的护理满意率，减少护理风险事件以及护理投诉的发生，值得临幊使用和推广。

【参考文献】

- [1] 宋开玲, 辛友红, 赵兰. 安全隐患自查模式在手术室护理风险管理中的应用效果 [J]. 中国卫生产业, 2019(23):8-9+13.
- [2] 马腾. 安全隐患自查模式在手术室护理风险管理中的应用效果 [A]. 中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会. 2019 教育信息化与教育技术创新学术研讨会论文集 [C]. 中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会: 重庆市鼎耘文化传播有限公司, 2019:3.
- [3] 郭雪萍. 安全隐患自查模式应用在手术室护理风险管理的有效性 [J]. 实用临床护理学电子杂志, 2019, 4(28):172-173.
- [4] 甄红. 安全隐患自查模式在手术室护理风险管理中的应用效果 [J]. 临床医药文献电子杂志, 2019, 6(23):114-115.
- [5] 李卓瑶. 安全隐患自查模式在耳鼻喉手术室护理风险管理中的应用效果 [J]. 全科护理, 2018, 16(30):3810-3812.