

改良式插胃管在临床清醒患者中的应用

陈柳珠

广东省兴宁市人民医院 514500

【摘要】目的 探讨改良式插胃管在临床清醒患者中的应用。**方法** 选择了我院 2019 年 5 月至 2020 年 5 月共 80 例清醒患者采用了改良式插胃管的方法。**结果** 76 例患者一次插管成功, 4 例患者再次插管成功。**结论** 改良式插胃管能提高患者插管成功率, 缩短操作时间, 减轻病人痛苦。

【关键词】 插胃管; 清醒患者; 护理操作

【中图分类号】 R472

【文献标识码】 A

【文章编号】 1005-4596 (2021) 01-141-01

【Abstract】Objective to explore the modified a gastric tube in the clinical application of conscious patients. **Methods** choose from May 2019 to May 2020, a total of 80 cases of lucid patients adopted the approach of stomach tube improved. **Results** 76 patients were a successful intubation, again successful intubation in 4 patients. **Conclusion** the modified a gastric tube can improve the success rate of intubation patients, shorten the operation time, reduce the patient's pain.

【Key words】 gastric tube insertion, conscious patient nursing operation

插胃管是将导管经鼻(口)腔插入胃内的方法, 对于清醒患者插胃管, 病人常因胃管刺激咽部干呕, 无法忍受, 增加了留置胃管的难度。本文选取了从 2019 年 5 月至 2020 年 5 月共 80 例清醒患者采用了改良式插胃管的方法: 1, 充分润滑胃管前端, 于 2-3mL 石蜡油滴入病人口中, 刺激病人做吞咽动作, 润滑病人咽喉部, 同时可增加病人胃管通过的顺利度 2, 在插入胃管长度的基础上, 再插入 4~5cm, 使胃管到达胃体部, 从而更加容易抽出胃液, 提高确定率, 大大提高了插管成功率, 现将方法介绍如下:

1 一般资料

予 2019 年 5 月至 2020 年 5 月共 80 例清醒患者, 男 60 例, 女 20 例, 年龄 40 至 80 岁。

2 方法

备齐插胃管的物品, 协助患者取半坐卧位(1), 清洁鼻孔检查胃管是否通畅, 测量长度(鼻尖到耳垂再到剑突)(2)分别做好标记充分润滑胃管前端, 予 2~3mL 石蜡油滴入病人口中(3), 刺激病人做吞咽动作, 润滑病人咽喉部, 同时可增加病人胃管通过的顺利度(4)随着病人做吞咽动作, 插

入胃管至第一个标记时再快速并轻柔插入至第二个标记处, 再插入 4~5cm 使胃管到达胃体部, 从而更容易抽出胃液, 提高确定率。

3 结果

80 例患者 76 例患者一次插管成功, 4 例患者因胃管刺激咽部太过敏感, 再次插管成功。

4 结论

插管时患者取半坐卧位 70~80 度, 予 2~3mL 石蜡油滴入患者口中, 随患者做吞咽动作插入胃管, 提高插管成功率, 缩短操作时间, 减轻病人痛苦。

参考文献

- [1] 吴兰苑, 曾燕梅. 改良式插胃管法在气管插管患者中的应用[J]. 2016 年 4 月(中)第 26 卷
- [2] 黄桂贤, 彭叔辉, 黄艺仪, 等. 改良式插胃管法在临床中的应用效果观察[J]. 现代临床护理 2011.10(5)
- [3] 饶小英. 改良式胃管插入法临床应用效果观察[J]. 基层医学论坛 2013 年 6 月第 17 卷第 18 期

(上接第 139 页)

意率为 95.83%, 对照组为 83.33%。试验组明显高于对照组。两组对比, 差异具有统计学意义($P < 0.05$)。比较护士信任度, 试验组为 97.92%, 对照组为 85.42%。试验组明显高于对照组。两组对比, 差异具有统计学意义($P < 0.05$)。

总之, 新生儿用全程优质护理模式, 能提高家属对护士的信任度以及对护理工作的满意率, 临床应用价值颇高。

参考文献

- [1] 李芳. 新生儿护理中全程优质护理的实施效果[J]. 内蒙古中医药, 2014, 33(22):121.
- [2] 张巧阳. 新生儿临床护理中全程优质护理实施的效果

观察[J]. 中外女性健康(下半月), 2014, (7):80-80, 58.

[3] 孙秀梅. 探讨全程优质护理模式在新生儿护理中的应用效果[J]. 中国卫生标准管理, 2015, 6(21):215-216.

[4] 傅思勇. 观察全程优质护理模式在新生儿护理中的应用效果[J]. 医学信息, 2015, 28(46):247.

[5] 李茜, 宋洪玉. 新生儿全程优质护理模式的护理效果评价[J]. 中国社区医师, 2016, 32(8):154-155, 157.

[6] 罗美芳. 全程优质护理模式在新生儿护理中的应用分析[J]. 大家健康(中旬版), 2014, (7):301-302.

[7] 沈国芳. 探讨全程优质护理模式在新生儿护理中的应用[J]. 健康必读(中旬刊), 2013, 12(11):374.

(上接第 140 页)

45(004):748-752.

[2] Liu S, Tsang M, Abdel-Qadir H, et al. Percutaneous coronary intervention for the management of stable ischemic heart disease[J]. Current Opinion in Cardiology, 2019, 34(5):557-563.

[3] 刘红伟. 舒适护理干预在冠心病心绞痛合并抑郁患者中的应用[J]. 重庆医学, 2019, 45(A01):386-388.

[4] 张耕瑞, 杨丽, 段东奎, 等. 正念放松训练对经皮冠状动脉介入治疗患者心理应激反应及睡眠质量影响的研究[J]. 中华护理杂志, 2018, 053(012):1463-1467.