

血管外科腔静脉滤器植入护理效果

任 莉

岳池县人民医院胸外普外一科 638300

〔摘 要〕目的 探讨血管外科腔静脉滤器植入护理效果。方法 选取我院血管外科 2019 年 8 月~2020 年 8 月收治的 50 例腔静脉滤器植入患者为研究对象,通过数字随机表的方式,将患者划分成两组,每组各 85 例,一组为常规组,采用常规护理模式,另一组为干预组,采用人性化护理模式,对比两组患者护理满意度。结果 干预组满意度的 92% 高于常规组的 72%。结论 对腔静脉滤器植入患者护理时,采用人性化护理模式,将会加强对并发症的预防,有利于患者心态的调整,进而提升患者对护理工作的满意度,应将人性化护理模式大规模推广。

〔关键词〕血管外科;腔静脉滤器植入;满意度

〔中图分类号〕R47 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165 (2021) 02-146-02

静脉血栓栓塞症(VTE)是较为血管外科较为常见的疾病之一,若血栓脱落,会对肺部、心脏等诸多习惯造成影响,对患者具有较大威胁。所以,需要通过腔静脉滤器植入的方式对 VTE 治疗,以预防血栓脱落,降低对患者生命安全的危害性。整个治疗周期内,患者受到疾病的影响,很容易出现抑郁、烦躁等负面情绪,同时还可能会出现腔静脉损伤、滤器移位等,影响治疗效果^[1]。所以,在治疗的同时,应向患者提供良好的护理服务。基于此,本文选取我院血管外科 2019 年 8 月~2020 年 8 月收治的 50 例腔静脉滤器植入患者进行了回顾性分析,以寻找出一种效果更加良好的护理方案,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院血管外科 2019 年 8 月~2020 年 8 月收治的 50 例腔静脉滤器植入患者为研究对象,通过数字随机表的方式,将患者划分成两组,每组各 25 例,一组为常规组,男 17 例,女 8 例,年龄 31~76 岁;另一组为干预组,男 19 例,女 6 例,年龄 30~78 岁。两组资料基本相同,无明显差异($P > 0.05$),可对比研究。

纳入标准:年龄 > 18 岁;符合腔静脉滤器植入标准;愿意配合本次研究者

排除标准:伴有静神经病;意识模糊;中途转院者。

1.2 方法

对照组护理时,采用常规护理模式,如心理疏导、运动指导等。干预组护理时,采用人性化护理模式,主要有:术前,针对患者性格、文化程度等因素,采取针对性的讲解方式,向患者讲述疾病、治疗方式等相关知识,提升患者对相关知识的了解程度;主动与患者交流,拉近护患间的关系,提升患者的配合度。术中,在病床旁边,轻轻与患者交谈,转移患者注意力,减少患者对手术状况的关注程度;仔细帮患者擦拭汗水,遮挡私密部位,给予每一位患者充分尊重;仔细观察患者体征,及时发现问题,并告知医生,减少异常情况对患者治疗造成干扰^[2]。术后,手术护士与病房护士仔细交谈,告知对方患者术中具体情况,使对方能够制定出针对性更强的术后护理方案。对于相类似的患者,运送到相同病房内,予以集中管理;按照要求制定探视制度,保证患者家属能够探望的同时,提升患者休养时间;加强对患者家属进行引导,使患者家属参与到护理工作当中。

1.3 观察指标

通过本院自制的《患者满意度调查问卷》,评估患者对本次护理工作的满意情况,总分 100 分,分值 ≥ 90 表示很满意;分值在 75~89 范围内表示满意;分值在 60~74 范围内表示一般,分值 < 60 表示不满意,满意度 = (很满意 + 满意) / $n \times 100\%$ 。

1.4 统计学处理

研究时,通过 SPSS20.0 软件,对临床数据予以处理,计数资料采用率(%)表示,以 χ^2 检验, $P < 0.05$ 表示差异具有统计学意义。

2 结果

研究发现,常规组患者满意度为 82.36%,干预组患者满意度为 95.29%,干预组高于常规组,两组数据差异显著($P < 0.05$),具有统计学意义,如表 1 所示。

表 1: 满意度对比结果

组别	n	很满意	满意	一般	不满意	满意度
干预组	25	20	3	1	1	23 (92%)
常规组	25	12	6	3	4	18 (72%)
χ^2		6.044	0.608	2.802	5.152	7.17
P 值		0.014	0.437	0.094	0.023	0.07

3 讨论

腔静脉滤器植入是 VTE 患者较为常见的治疗手段之一,效果较为良好,可以有效对血栓脱落进行预防与处理,对患者康复具有重要意义^[3]。然而通过大量临床实践表明,部分患者治疗效果依然不是很理想,对患者术后生活及康复造成较大影响。所以,患者治疗的同时,应向其提供良好的护理服务。以往阶段,主要采用常规护理,效果较为良好,在一定程度上转变患者心态,加快康复速度,患者具有较高的满意度。而随着社会的发展,人民的生活水平不断提升,逐渐对医疗护理提出了更高的要求,依然采用常规护理嘛事,将很难达到患者需求,进而降低了患者的满意度。为了转变这一情况,可采用人性化护理模式。术前,通过针对患者具体情况,选择合理的讲解方式,有效提升讲解效果,使患者对疾病、手术方式具有更高的了解程度。同时,由于护患关系拉近,会使患者对护理人员产生信赖感,愿意听取医嘱的安排。术中,通过患者注意力的转移,减少对手术状况的关注程度,以免产生紧张的心态,对手术状况造成影响;通过皮肤擦拭、隐私部位遮盖等方式,也会调整患者心态。术后,因病房护士对患者术中情况更加了解,可制定出更加合理的护理方案,有利于患者术后康复;集中对类似患者护理,不仅降低护理人员工作量,而且还会提升护理效果等。由于家属参与进来,会在亲情的引导下加快患者康复^[4]。此外,本研究发现,干预组满意度的 92% 高于常规组的 72%,与上述理论分析基本相同。

总之,对腔静脉滤器植入患者护理时,采用人性化护理模式,将会加强对并发症的预防,有利于患者心态的调整,进而提升患者对护理工作的满意度,应将人性化护理模式大规模推广。

〔参考文献〕

(下转第 153 页)

3 讨论

急性胰腺炎的复发风险大,部分患者须经历反复住院的折磨,导致情绪失衡而引发其他心理疾病,进一步延缓患者的治愈进程。经临床实践显示,护理干预是帮助急性胰腺炎改善症状和恢复胃肠道功能的有效路径。综合护理是临床主流护理模式之一,已成为多种疾病治疗的辅助手段,将其应用于急性胰腺炎中,能通过心理护理、饮食护理、引流管护理及疼痛护理等诸多方式,帮助患者改善情绪,提升生活质量^[3]。本文结果显示,观察组护理后的情绪状态优于对照组,其焦虑及抑郁评分均低于对照组,差异 $P<0.05$;观察组护理后的生活质量评分高于对照组,且差异明显

($P<0.05$)。

综上所述,对急性胰腺炎患者予以综合护理的价值理想,助于患者合理控制不良情绪,实现生活质量提升,值得临床推行实践。

[参考文献]

- [1] 郑振芳.综合护理应用于急性胰腺炎急救护理中的临床效果观察研究[J].家有孕宝,2020,2(20):167.
- [2] 陈英利,王春风,荆怡.综合护理在急性胰腺炎患者中的临床应用价值[J].中国民康医学,2019,31(18):151-152.
- [3] 王芳伟.芒硝外敷联合清胰汤治疗重症急性胰腺炎的效果观察及护理研究[J].按摩与康复医学,2020,11(19):86-88.

(上接第 146 页)

[1] 夏帮芬.1 例急性脑出血患者并发下肢深静脉血栓形成行下腔静脉滤器植入术的护理体会[J].科学养生,2019,03(08):276.

[2] 马倩倩.下腔静脉滤器置入联合导管溶栓治疗下肢深静脉血栓形成(DVT)的术后护理方法及效果探讨[J].健康必读,

2019,18(13):64.

[3] 邱琳.下肢深静脉血栓行下腔静脉滤器置入加置管药物溶栓术护理方法及效果[J].世界最新医学信息文摘(电子版),2019,19(86):306,318.

[4] 刘川.优质护理在下腔静脉滤器植入术围手术期的应用[J].中国医药指南,2019,15(34):89.

(上接第 147 页)

与应用。

[参考文献]

- [1] 韩芳.沟通技巧在骨科门诊骨折患者治疗中的应用分析[J].实用临床护理学电子杂志,2019,004(013):P47-47
- [2] 周莉,代虹珍.浅谈护患沟通技巧在骨折患者健康宣教中

的应用浅谈护患沟通技巧在骨折患者健康宣教中的应用[J].心理医生,2018,24(3):299-300.

[3] 邓雪辉,封思思.骨科老龄患者护理工作中非语言艺术沟通技巧[J].当代护士(下旬刊),2018,25(8):183-184.

[4] 尹潮.护患沟通技巧在骨科护理中的应用分析[J].饮食保健,2019,6(32):128.

(上接第 148 页)

热疗集中与提提,来扩张患处的毛细血管,加速患者的血液循环,来促进患者炎性因子的吸收,来改善肌肉痉挛的情况^[3]。此次研究结合两组患者的疼痛情况进行分析,研究组干预后的疼痛评分更低, $P<0.05$ 。

综上所述,腰椎间盘突出症患者应用规范化护理联合中药熏蒸进行干预后,临床效果显著,明显改善患者的疼痛程度,具有临床应用价值。

[参考文献]

- [1] 李琳.中药热敷配合全面护理干预在腰椎间盘突出症患者中的应用[J].临床研究,2021,29(01):176-177.
- [2] 杨威,唐福宇,梁冬波,田凯.中药熏洗治疗腰椎间盘突出症的用药规律[J].广西医学,2018,40(08):968-970.
- [3] 陈新柱.中药熏药联合温针灸治疗腰椎间盘突出症临床观察[J].按摩与康复医学,2018,9(04):53-54.

(上接第 149 页)

等缺点,通过多种科学护理措施体现出出血性脑卒中并发癫痫患者的精细化、科学化护理,临床护理效果显著^[5]。

[参考文献]

- [1] 卜庆梅.出血性脑卒中并发癫痫的护理对策及疗效分析[J].中西医结合心血管病电子杂志,2019,007(031):101,104.
- [2] 李芬,魏容.出血性脑卒中并发癫痫的护理对策及效果分

析[J].医学理论与实践,2019,32(09):138-140.

[3] 王先琴.出血性脑卒中并发癫痫的护理对策及效果观察[J].现代医学与健康研究电子杂志,2018,000(008):P97-97.

[4] 翟盼盼.出血性脑卒中并发癫痫的护理对策及效果观察[J].临床医药文献电子杂志,2018,5(67):140-141.

[5] 宗艳红,岳婧茹,任美丽.个性化护理在出血性脑卒中并发癫痫患者中的应用效果观察[J].中国民康医学,2019,031(014):149-151.

(上接第 150 页)

肝腹水情况明显改善,对改善疾病的预后起到重要的作用,值得临床推广和借鉴。

[参考文献]

- [1] 张聪.全程优质护理应用于肝硬化护理中的效果研究[J].中国医药指南,2020,18(11):213-214.
- [2] 史冬平.全程优质护理在肝硬化护理中的应用[J].实用临

床护理学电子杂志,2019,4(48):26+31.

[3] 金燕.全程优质护理对肝硬化患者生存质量、护理效果及满意度的临床研究[J].河北医药,2019,41(05):791-794.

[4] 王静波.肝硬化患者实施全程优质护理干预的应用分析[J].临床医药文献电子杂志,2018,5(95):126.

[5] 谢丽霞.综合护理干预对肝硬化顽固性腹水患者的效果观察[J].基层医学论坛,2020,24(24):3450-3451.

(上接第 151 页)

护理质量,使伤口感染情况明显减少。

[参考文献]

- [1] 陈艳.伤口护理风险管理对门诊急诊患者伤口愈合及伤口感染的应用效果分析[J].饮食保健,2019,6(45):92.
- [2] 雷洁萍,曾秀娟.伤口护理风险管理对门诊急诊患者促进伤口愈合及提高护理满意度的效果分析[J].基层医学论坛,2020,

24(21):3042-3044.

[3] 卢少文.伤口护理风险管理对门诊急诊患者伤口愈合及伤口感染的应用效果[J].智慧健康,2020,6(24):113-114.

[4] 汤云,王颖竹,陆伟芳.伤口护理风险管理对门诊急诊患者伤口愈合及伤口感染的应用效果[J].饮食保健,2019,6(44):141.

[5] 洪菱.伤口护理风险管理对门诊急诊患者伤口愈合及伤口感染的应用效果[J].中国医学创新,2018,15(4):84-87.