

交通事故骨折患者中采用急诊护理路径的效果分析

杨文玲

兰州市第一人民医院 730050

【摘要】目的 探讨交通事故骨折患者中采用急诊护理路径的效果。**方法** 采集本院 2019 年 5 月至 2021 年 8 月期间接收的 118 例交通事故骨折患者, 随机分为对照组与观察组各 59 例, 对照组运用常规护理, 观察组运用急诊护理路径, 分析不同护理后患者有效抢救时间、分诊时间、救治成功率、护理满意度情况。**结果** 在患者有效抢救时间、分诊时间上, 观察组各项明显少于对照组, 对比有统计学意义 ($p < 0.05$); 在患者救治成功率上, 观察组为 96.61%, 对照组 77.97%, 对比有统计学意义 ($p < 0.05$); 在患者护理满意度上, 观察组 98.31%, 对照组 76.27%, 对比有统计学意义 ($p < 0.05$)。**结论** 交通事故骨折患者中采用急诊护理路径, 可以有效地加快救治速度, 提升患者救治成功率, 提高患者护理满意度, 整体状况更为理想。

【关键词】 交通事故; 骨折; 急诊护理路径; 效果

【中图分类号】 R473.6

【文献标识码】 A

【文章编号】 1005-4596 (2022) 01-165-02

骨折情况多样, 与交通事故、高处坠伤、锐器挫伤、跌倒摔伤、打架斗殴等多方面因素有关, 其中交通事故是较为常见的原因。而交通事故所导致的骨折情况, 是高能创伤问题, 伤情严重, 出血量更多, 甚至导致患者生命威胁。本文采集 118 例交通事故骨折患者, 分析运用急诊护理路径后患者有效抢救时间、分诊时间、救治成功率、护理满意度情况, 内容如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

采集本院 2019 年 5 月至 2021 年 8 月期间接收的 118 例交通事故骨折患者, 随机分为对照组与观察组各 59 例。对照组中, 男 32 例, 女 27 例; 年龄从 23 岁至 65 岁, 平均 (41.59 ± 9.07) 岁; 文化程度中, 初中及以下为 29 例, 高中为 18 例, 大学为 12 例; 观察组中, 男 36 例, 女 23 例; 年龄从 25 岁至 67 岁, 平均 (42.63 ± 7.18) 岁; 文化程度中, 初中及以下为 26 例, 高中为 23 例, 大学为 10 例; 两组患者的基本年龄、性别、文化程度等信息上没有明显差异, 有对比研究意义。

1.2 方法

对照组运用常规护理, 观察组运用急诊护理路径, 内容如下:

首先, 需要由护士长带头组织科室内的资深护士成立对应的急诊护理路径小组, 依据地方交通事故骨折情况特点, 做好对应的护理路径内容设定。

在接到 120 电话之后要, 确定发生事故的具体地址与基本伤亡情况, 而后派救护车在 5 分钟内及时出车。到现场做好急救处理, 再将患者搬到救护车上, 过程中需要避免其颈椎以及脊髓等组织受损, 保持稳定性。以最快的速度送到医院做救治处理。同时要在其过程中做好患者以及家属的情绪安抚工作, 提升其整体的配合度。在转运的过程中, 需要对有关科室做好联络沟通, 对救治工作开展对应的绿色通道, 保证患者及时检测, 以及进入到救治环节。将检测的结果及时反馈给专科医生, 依据情况做好对应护理方案设定。在进行救治工作之后, 需要依据患者情况做好临床护理路径的个性化设定。

在手术室中急救处理方面, 需要及时补充血容量进行止血, 防控大出血等风险问题。同时依据情况做好有关手术辅助工作, 过程中积极配合医生处理有关事项。在整体复苏过程中, 需要辅助患者做好各项生命体征的观测以及维持处理, 防控低体温以及代谢性酸中毒、凝血功能障碍等异常情况。做好有关生化指标观察, 进行机体整体状况的观察评估, 防控多器官功能障碍等问题。

1.3 评估观察

分析不同护理后患者有效抢救时间、分诊时间、救治成功率、护理满意度情况。护理满意度 = 很满意率 + 基本满意率。

1.4 统计学分析

数据运用 spss22.0 软件处理, 计数资料使用 $n(\%)$ 表示, 采用卡方检验, 计量资料运用 ($\bar{x} \pm s$) 表示, 采用 t 检验, $p < 0.05$ 有统计学意义。

2 结果

2.1 各组患者抢救情况

见表 1, 在患者有效抢救时间、分诊时间上, 观察组各项明显少于对照组, 对比有统计学意义 ($p < 0.05$); 在患者救治成功率上, 观察组为 96.61%, 对照组 77.97%, 对比有统计学意义 ($p < 0.05$);

表 1: 各组患者疾病恢复速度结果 ($\bar{x} \pm s$)

分组	n	有效抢救时间 (min)	分诊时间 (min)	救治成功率 (d)
观察组	59	44.78 ± 3.09	1.43 ± 0.68	57 (96.61)
对照组	59	67.51 ± 5.48	3.65 ± 1.17	46 (77.97)

注: 两组对比, $p < 0.05$

2.2 患者护理满意度情况

见表 2 所示, 在护理总满意率上, 观察组 98.31%, 对照组 76.27%, 对比有统计学意义 ($p < 0.05$);

表 2: 患者护理满意度评估结果 [$n(\%)$]

分组	n	很满意	基本满意	不满意	护理总满意率
观察组	59	35 (59.32)	23 (38.98)	1 (1.69)	98.31%
对照组	59	18 (30.51)	27 (45.76)	14 (23.73)	76.27%

注: 两组对比, $p < 0.05$

3 讨论

随着人们生活水平的不断提升, 交通工具的普及化, 现代交通的速度与能量也不断提高。人们交通法规意识相对淡薄, 容易出现各种交通事故, 由此产生的骨折情况也较为常见。在发达国家, 由于交通事故导致的创伤性骨折死亡率甚至高居第 3 位, 由此可以意识到交通事故带来的创伤性骨折损伤影响性较大。除了规范的治疗, 护理工作的支持在一定程度上也可以提升治疗恢复的速度以及质量, 减少不良问题因素带来的影响。一般情况下, 交通事故产生的组织损伤案例情况会呈现患者休克与濒临死亡的状况, 对于患者身心构成的创伤相对较大。因此需要积极的展开有关心理护理支持工作, 稳定患者以及家属的情绪, 提升其手术救治工作的配合度, 减少消极情绪带来的护理工作压力。同时

(下转第 170 页)

导致深静脉血栓形成的因素十分复杂，深静脉血栓的发生会对患者的生命安全产生极大的威胁，肺结核患者极易出现血栓病症。为防止形成深静脉血栓，需要对相关危险因素充分了解，并采取有效的预防措施。护理人员需要将相关知识熟练掌握，准确的评估危险因素，对高危患者进行筛选，并采取针对性的干预措施，进而实现对下肢深静脉血栓形成的有效预防。

本文通过探究对结核性脑膜炎患者加强护理干预对预防下肢深静脉血栓形成的效果，结果显示，相比于对照组，观察组护理满意度(97.5%)较高，下肢深静脉血栓形成发生率(2.5%)较低(P<0.05);干预后，观察组生活质量评分均较高(P<0.05)。

综上所述，在结核性脑膜炎患者群体内实施护理干预，可实现患者护理满意度的提升，避免下肢静脉血栓的形成，以此实现患者生活质量的改善与提升。

参考文献

[1] 王银银, 田甜, 李方方. 早期活动锻炼在预防慢性阻塞性肺疾病机械通气病人下肢深静脉血栓形成中的应用[J]. 血栓与止血学, 2022, 28(06):956-957.
 [2] 尚静, 王锐, 王静. 循证综合护理干预预防腹腔镜胃癌根治术后患者下肢深静脉血栓形成的效果[J]. 血栓与止血学, 2022, 28(06):1041-1042+1044.

[3] 陆雷雷, 徐玉兰, 范海波, 孙莉. 专项护理对ICU患者下肢深静脉血栓形成及凝血指标的影响[J]. 血栓与止血学, 2022, 28(06):1061-1062+1064.
 [4] 卓燕薇, 杨薇. 结核性脑膜炎患者预防下肢深静脉血栓形成的护理探讨[J]. 血栓与止血学, 2021, 27(02):333-334.

表3: 对比生活质量 ($\bar{x} \pm s$, 分)

检查指标	观察组 (n=65)	对照组 (n=65)	t	P	
生理功能	治疗前	67.35±11.65	68.15±11.95	6.241	>0.05
	治疗后	85.65±12.94	73.75±13.82	12.811	<0.05
活力	治疗前	58.24±10.84	57.64±10.64	4.055	>0.05
	治疗后	86.64±11.25	70.11±12.32	12.032	<0.05
社会功能	治疗前	61.54±13.91	62.17±12.88	8.511	>0.05
	治疗后	88.65±11.28	74.81±10.85	12.013	<0.05
情感职能	治疗前	61.54±13.91	62.17±12.88	6.952	>0.05
	治疗后	87.37±11.62	75.71±11.55	15.241	<0.05
精神健康	治疗前	48.84±11.62	47.58±14.35	2.587	>0.05
	治疗后	85.28±11.94	76.31±13.88	16.211	<0.05
总体健康	治疗前	64.68±11.54	65.49±13.63	9.657	>0.05
	治疗后	88.23±11.77	75.82±10.37	10.022	<0.05

(上接第165页)

要做好有关救治工作的绿色通道，流程化的设置减少因为流程不畅而导致的治疗延误。总而言之，交通事故骨折患者中采用急诊护理路径，可以有效地加快救治速度，提升患者救治成功率，提高患者护理满意度，整体状况更为理想。

参考文献

[1] 冉婉, 李海清, 钟足娣. 急诊护理路径在交通事故骨折患者中的应用[J]. 中国伤残医学, 2021, 29(1):79-81.

[2] 陈聪. 预见性护理在急诊创伤性骨折患者救治中的应用分析[J]. 母婴世界, 2021(9):186.

[3] 任龙梅, 魏润玲. 心理护理对老年肱骨骨折急诊患者手术效果及护理满意度的影响效果研究[J]. 中国保健营养, 2021, 31(21):138.

[4] 张艳. 对下肢多发性骨折合并休克患者进行急诊护理的体会[J]. 婚育与健康, 2021(10):65.

(上接第166页)

从而也会降低治疗的效果。而本文通过对消化溃疡的患者进行健康教育宣传以及心理护理等护理措施，增加了患者对疾病的认知，同时也提高了患者对医护人员的配合度和依从性，改善患者出现焦虑和抑郁等不良的心理情绪，提高患者的治疗效果，在临床上这个推广和使用。

参考文献

[1] 黄向平, 林红华, 王丽静, 石临静, 郭秀欣. 综合护

理干预对消化溃疡伴焦虑抑郁患者的影响[J]. 齐鲁护理杂志, 2020.16(09):24-26.

[2] 朱蓓蓓, 宋玲, 黄峰, 于川. 护理干预对焦虑与抑郁型消化内科患者的影响[J]. 护理实践与研究, 2020, 9(08):25-26.

[3] 魏绍敏, 周红梅, 李莉, 陆吉. 综合护理干预在消化性溃疡伴抑郁患者中的疗效观察[J]. 国际精神病学杂志, 2020, 43(01):125-128.

(上接第167页)

[1] 龚义侠, 贾峥嵘, 张媚. 基层医院实施优质护理服务模式对产妇产后及新生儿护理效果的影响[J]. 中华现代护理杂志, 2020, 19(14):1682-1684.

[2] 曹春雅, 姚琼, 张珍. 优质护理结合妇产科电脑综合

治疗仪在剖宫产术后的临床应用[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2020, 34(21):3260-3261.

[3] 邓琼芳. 优质护理服务模式对妇产科术后患者腹部切口恢复情况的影响效果[J]. 川北医学院学报, 2020, 31(4):608-610.

(上接第168页)

[1] 李敏, 柏亚妹, 刘云. 穴位电刺激联合间歇性充气加压预防颅脑损伤患者下肢深静脉血栓形成[J]. 护理学杂志, 2020, 32(22):10-12.

[4] 杨丹丹, 周夏伶, 滕云. IPC在妇科盆腔术后预防下肢

深静脉血栓的应用效果观察[J]. 湖南师范大学学报(医学版), 2020, 13(3):127-130.

[5] 卫飞燕, 王艳南, 马为, 等. 间歇充气加压在预防慢性阻塞性肺疾病患者下肢深静脉血栓形成中的应用[J]. 血栓与止血学, 2020, 23(5):807-808, 811.