

# 脑外伤失语症患者中采用高压氧护理的效果分析

金田丽

兰州市第一人民医院 730050

**【摘要】目的** 探讨脑外伤失语症的患者使用高压氧护理的效果。**方法** 将 2020 年 9 月到 2021 年 9 月在本院进行治疗的脑外伤失语症的患者 80 例作为本次的观察对象，并将这 80 例脑外伤失语症的患者随机分为实验组和对照组两组，每组有 40 例脑外伤失语症的患者，而对照组的 40 例脑外伤失语症的患者使用常规的护理措施进行护理，实验组的 40 例脑外伤失语症的患者则是采用高压氧护理进行护理，将两组脑外伤失语症患者护理前后临床效果的评分情况进行对比和分析。**结果** 在两组脑外伤失语症患者护理前，两组患者临床效果对比后产生的差异数据不具有统计学意义 ( $p > 0.05$ )，而两组脑外伤失语症的患者在进行护理后，采用高压氧护理措施进行护理的实验组脑外伤失语症的患者临床效果优于采用常规护理的对照组脑外伤失语症的患者，且两组脑外伤失语症患者的临床效果对比后产生的差异数据具有统计学意义 ( $p < 0.05$ )。**结论** 本文对脑外伤失语症的患者使用高压氧护理措施进行护理，能够提高脑外伤失语症患者的治疗效果，并且促进患者的预后恢复，在临床上值得推广和使用。

**【关键词】** 脑外伤失语症；高压氧护理

**【中图分类号】** R473

**【文献标识码】** A

**【文章编号】** 1005-4596 (2022) 04-110-02

脑外伤失语症的患者在临床上会出现语言障碍的症状，因为脑外伤会导致患者对于人们交际的符号系统以及表达能力出现损伤，所以患者对于语音以及语言的结构和语言的内容等出现障碍的情况，而高压氧护理能够提高脑外伤失语症患者的含氧量，并且提高患者的血氧分压，明显地改善患者脑组织缺血以及缺氧的症状，从而促进患者恢复健康。本文将对脑外伤失语症的患者使用高压氧护理措施进行护理，并将护理的结果进行对比和分析。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

将 2020 年 9 月到 2021 年 9 月在本院进行治疗的脑外伤失语症的患者 80 例作为本次的观察对象，并将这 80 例脑外伤失语症的患者随机分为实验组和对照组两组，每组有 40 例脑外伤失语症的患者，而对照组的 40 例脑外伤失语症的患者中有男性患者 25 例，女性患者 15 例，年龄在  $(45.37 \pm 2.38)$  岁，而实验组的 40 例脑外伤失语症的患者中有男性患者 29 例，女性患者 11 例，年龄在  $(45.67 \pm 2.98)$  岁，两组脑外伤失语症的患者均符合本次研究的纳入标准，并且两组脑外伤失语症患者的临床资料对比之后产生的差异数据不具有统计学意义 ( $p > 0.05$ ) 具有可比性。

### 1.2 方法

对照组的 40 例脑外伤失语症的患者使用常规的护理措施进行护理，而实验组的 40 例脑外伤失语症的患者则采用高压氧护理措施进行护理，主要的内容包括：1. 首先护理人员需要对脑外伤失语症的患者进行入舱前的护理工作，在患者入舱前，护理人员需要根据患者的实际情况进行调整，同时还应该做好充分的准备工作。为患者详细的介绍高压氧护理的相关知识，以及对于脑外伤失语症患者的治疗意义，同时还应该将护理过程中的注意事项告知给患者，从而提高患者对护理工作的配合度以及依从性。2. 入舱后的护理工作，在患者入舱以后，护理人员应该将舱内的压力进行良好的控制，保证压力的匀速，当气压平稳以后患者应该佩戴面罩进行吸氧治疗的准备。3. 在患者出舱之前，护理人员需要做好对舱内减压的工作，同时护理人员需要提醒患者，在舱内减压的过程中应该做鼓腮或者张口的动作，如果患者在舱内解压的过程中出现了身体不适的情况，可以出舱。4. 在患者出舱以后，护理人员需要对患者的生命体征情况进行严密的观察，并且

还应该制定脑外伤失语症患者饮食的方案，指导患者应该食用流质饮食并且含有高营养以及高蛋白的饮食。5. 对脑外伤失语症的患者进行心理护理，护理人员应该主动的与脑外伤失语症的患者进行沟通和交流，并且改善患者内心负面的情绪，提高患者对疾病治疗的信心，同时也能够帮助患者树立战胜疾病的信心。

### 1.3 观察指标

将两组脑外伤失语症患者护理前后临床效果的评分情况进行对比和分析。

### 1.4 统计学分析

采用 SPSS20.0 软件对数据进行处理和分析，计数资料用 (n/%) 来表示，用  $\chi^2$  进行检验，计量资料用标准差  $\pm$  来表示，用 t 进行检验，当  $p < 0.05$  时具有统计学意义。

## 2 结果

两组脑外伤失语症患者在护理前，两组患者临床效果对比产生的差异数据不具有统计学意义 ( $p > 0.05$ )，而两组脑外伤失语症患者在护理后，采用高压氧护理的实验组脑外伤失语症的患者临床效果优于采用常规护理的对照组脑外伤失语症的患者，且两组脑外伤失语症患者的临床效果对比后产生的差异数据具有统计学意义 ( $p < 0.05$ ) 见表 1

表 1: 两组患者护理前后临床效果的对比情况

组别	例数	护理前	护理后
对照组	40	39.23±5.27	45.21±5.23
实验组	40	35.46±5.26	80.23±6.24
t		2.378	23.276
P		> 0.05	< 0.05

## 3 讨论

为了能够有效的缓解脑外伤失语症患者脑组织缺血、缺氧以及脑水肿的状况，所以在进行有效的治疗时，还应该配合使用合理的护理措施，提高患者的生活质量以及临床治疗效果。而高压氧护理措施能够明显的改善患者的临床症状，同时还能够缓解患者不良的心理情绪，提高患者对健康知识的掌握度，促使患者能够尽快的恢复健康，提高患者对疾病治疗的依从性以及配合度。

综上所述，本文对脑外伤失语症的患者使用高压氧护理措施进行护理，高压氧护理能够改善患者的负面情绪，帮助患

(下转第 115 页)

肛肠科常见的一种疾病为痔疮,多采取手术治疗方式<sup>[4]</sup>。手术作为应激反应的一种,导致患者术后出现不同程度疼痛,导致患者出现抑郁、焦虑等不良情绪,延长恢复时间<sup>[5]</sup>。临床多采取常规护理,以减轻患者疼痛,但经临床实践研究证实,未能达到预期效果,且患者满意度较低<sup>[6-7]</sup>。

优质护理作为全新的一种护理干预模式,充分考虑患者实际需求,为患者提供疼痛优质护理、日常优质护理、健康宣教以及饮食优质护理等,改善患者心理状态,促进其生命质量提升<sup>[8]</sup>。优质护理不仅注重调节患者不良心情,还注重患者个人身体健康,为患者提供社会支持,使其精神状态达到最佳<sup>[9]</sup>。本研究结果表明,两组患者护理质量评分对比,研究组较参照组高。提示优质护理可促进护理质量提升。干预后两组疼痛评分对比,研究组较参照组低。提示优质护理可有效缓解患者术后疼痛。另外,研究组护理满意度(97.37%)明显较参照组(76.32%)高。

综上所述,痔疮切除术患者术后应用优质护理可纠正患者存在的负性情绪,促进护理质量与满意度提升。

#### 参考文献

[1] 吕芳.舒适护理在痔疮围手术期患者中的应用措施和

护理质量观察[J].中外医疗,2020,39(25):129-132.

[2] 朱国瑞.舒适护理在痔疮围手术期患者中的应用及效果分析[J].中国肛肠病杂志,2018,38(10):70-71.

[3] 周昀霞,蒋运兰,曾洋洋,等.集束化综合护理对ICU老年患者术后负面情绪障碍的影响[J].西部医学,2018,30(8):4.

[4] 刘佳.分析舒适护理在痔疮围术期患者中的应用及效果观察[J].中国医药指南,2018,16(20):258-259.

[5] 郭瑶.舒适护理在痔疮围手术期患者中的应用效果评价[J].健康之路,2018,17(07):189.

[6] 袁亲飞.舒适护理在痔疮围手术期患者中的应用效果研究[J].中国继续医学教育,2018,10(16):187-188.

[7] 温雅娜.舒适护理在痔疮围手术期患者中的应用及效果观察[J].首都食品与医药,2018,25(10):89.

[8] 王德丽,陈杰,孟龙女.舒适护理在痔疮围手术期患者中应用效果分析[J].实用临床护理学电子杂志,2018,3(19):3-4.

[9] 刘雅珉.舒适护理在痔疮围手术期患者中的应用效果观察[J].继续医学教育,2018,32(01):127-129.

(上接第 110 页)

者树立战胜疾病的信心,促进患者疾病的恢复,同时提高患者治疗的效果,在临床上值得推广和使用。

#### 参考文献

[1] 胡春艳.高压氧护理干预在脑外伤失语症中的应用效果[J].临床医药文献电子杂志,2021(24):122.

[2] 白玉存.高压氧护理干预在脑外伤失语症中的应用效果[J].实用临床护理学电子杂志,2021,3(42):17+31.

[3] 莫正霞,安春霞,马金栋.高压氧护理干预对脑外伤失语症患者的效果分析[J].中国农村卫生,2021(12):8.

[4] 张得兰,郭艳红,高静.脑外伤失语症应用高压氧护理干预的效果分析[J].大家健康(学术版),2021,10(01):260-261.

(上接第 111 页)

学创新,2019,16(21):74-78.

[1] 刘淑晶.综合护理干预在子宫肌瘤行腹腔镜切除术患者中的应用效果[J].实用临床护理学电子杂志,2020,5(19):147.

[4] LEE, JAE YOUNG, CHUNG, HYUN HOON, KANG, SOO YEON, et al. Portable ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound with functions for safe and rapid ablation: prospective clinical trial for uterine fibroids-short-term and long-term results[J]. European radiology,2020,30(3):1554-1563.

(上接第 112 页)

良生活习惯,帮助其建立恢复信心,从而对病患依从性有提升作用,让其积极配合参与护理工作,对病患恢复及院内发展均有积极影响。总而言之,老年性脑梗塞病患应用优质护理服务效果较好,对病患神经功能、运动功能及生活品质均有改善作用,应用价值较高。

#### 参考文献

[1] 任亚明,李玲杰,张冬.老年性脑梗塞患者护理中优质护理服务的临床应用价值研究[J].全科口腔医学电子杂志,

2020,7(06):84-85.

[2] 赵志娟.老年性脑梗塞患者护理中优质护理服务的应用效果研究[J].临床医药文献电子杂志,2021,5(44):104-105.

[3] 于锦红,勾霞.优质护理服务在 62 例老年性脑梗塞护理中的应用效果分析[J].中外医疗,2021,34(08):170-172.

[4] 杨雪勤,孙燕楠,毋佳楠.优质护理服务在老年性脑梗塞护理中的应用探讨[J].现代诊断与治疗,2019,30(07):1184-1185.

[5] 周金仙.优质护理服务在老年性脑梗塞护理中的应用效果分析[J].现代诊断与治疗,2020,26(11):2632-2633.

(上接第 113 页)

解患者的不良情绪减少并发症的发生,从而有效提升患者的生活质量,值得推广应用。

#### 参考文献

[1] 马延超,陶琳,易银萍,等.心理护理干预在老年冠心病介入治疗患者中的应用[J].山西医药杂志,2021,50(15):2360-2362.

[2] 岳全英.多元化护理干预对经皮冠状动脉介入术治疗的冠心病患者生活质量及心理状态影响[J].中国药物与临床,

2020,20(10):1755-1757.

[3] 付瑶,杨敏.老年冠心病冠状动脉支架置入术后预见性护理干预对并发症的影响[J].中国药物与临床,21(12):2218-2220.

[4] Yang J, H Hu, Li Y. Effect of Dual-track Interactive Nursing Intervention Model on Anxiety and Depression in Patients with Coronary Heart Disease[J]. Psychiatria Danubina, 2020, 32(2):197-204.