

护理风险管理在冠状动脉介入治疗术患者护理中的应用

龚梅惠子

麻城市人民医院介入中心 438300

【摘要】目的 分析护理风险管理在冠状动脉介入治疗术患者护理中的应用效果。**方法** 从 2019 年 7 月至 2021 年 5 月在我院行冠状动脉介入术治疗的患者中随机选取 54 例, 将其随机分为对照组和观察组, 各 27 例, 分别对其实施常规护理管理和护理风险管理, 统计两组护理风险事件, 并行统计学比较。**结果** 以护理风险事件发生率为评价指标, 与对照组 (14.81%) 相比较, 观察组 (3.70%) 更低, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。**结论** 对冠心病患者实施冠状动脉介入术治疗的过程中, 给其配合应用护理风险管理, 能够有效降低治疗过程中的护理风险事件, 有推广价值。

【关键词】 护理风险管理; 冠状动脉介入术; 护理风险事件

【中图分类号】 R473

【文献标识码】 A

【文章编号】 1005-4596 (2022) 05-093-02

【Abstract】Objective To analyze the application effect of nursing risk management in nursing of patients undergoing coronary intervention. **Methods** From July 2019 to May 2021, 54 patients who underwent coronary intervention in our hospital were randomly selected and randomly divided into control group and observation group, 27 cases in each group, and received routine nursing care respectively. Management and nursing risk management, statistics of two groups of nursing risk events, parallel statistical comparison. **RESULTS** As the evaluation index of nursing risk event incidence rate, compared with the control group (14.81%), the observation group (3.70%) was lower, and the difference was statistically significant ($P < 0.05$). **Conclusion** In the process of coronary intervention in patients with coronary heart disease, nursing risk management can effectively reduce the nursing risk events in the process of treatment, and it has promotion value.

【Key words】 nursing risk management; coronary intervention; nursing risk events

冠状动脉介入术是临床上治疗冠心病患者的常用方式, 通过疏通狭窄甚至闭塞的冠状动脉管腔, 促进心肌血流灌注情况的改善。由于手术引发的并发症较多, 因此在治疗的过程中配合实施有效的护理管理也就显得极其重要。护理风险管理的应用为患者的生命安全做好保障。本次研究选取了 2019 年 7 月至 2021 年 5 月在我院治疗的 54 例冠心病患者, 通过比较详细的分析了护理风险管理的应用优势。具体如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

从 2019 年 7 月至 2021 年 5 月在我院行冠状动脉介入术治疗的患者中随机选取 54 例, 纳入标准: (1) 符合冠心病的诊断标准, 且经心电图、CT 等诊断被确诊; (2) 患者及家属均知情; 排除标准: (1) 合并严重的肝、肾功能障碍; (2) 合并严重的感染性疾病; (3) 合并精神疾病; (4) 合并恶性肿瘤。将其随机分为对照组和观察组, 各 27 例。观察组中男: 女=15: 12, 年龄 54-72 (63.38±4.81) 岁; 对照组中男: 女=14: 13, 年龄 53-73 (3.41±4.87) 岁。本次研究经过了本院伦理委员会的批准。两组一般资料差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。

1.2 方法

对照组: 常规护理管理。护理人员对患者实施查体、病情询问等基础护理, 当出现护理不良事件时进行积极解决。

观察组: 护理风险管理。首先进行护理风险识别, 护理人员对护理服务过程中可能存在的一些客观的风险进行归类 and 识别, 分析产生的原因, 比如容易发生风险事件的部位、环节、时间、患者类型等, 收集各项风险评估信息, 为制定完善的风险管理制度提供依据; 护理风险评估, 在护理风险识别的基础上, 对护理风险可能会造成的影响、损伤程度、发生的概率等进行评估, 根据风险的发生频率、风险造成的严重程度对风险的危险性进行评估。经过评估后发现患者进行手术治疗中存在的风险因素主要有疾病、护理人员配备不合理、

手术环境不达标、护理记录不完善等; 护理风险处理, 护理人员在上述护理风险评估的基础上, 对出现的护理风险事件进行有效的应对, 以护理风险管理为核心, 对于存在的一些高风险因素进行预防护理管理。比如在疾病方面, 加强培训学习, 提高护理人员护理风险的识别能力, 在护理人员配备方面, 合理安排护理人员的岗位数量, 手术环境方面, 加强监督检查, 保证手术环境的无菌性, 护理记录方面, 通过将护理记录进行表格化, 建立完善的护理记录抽查制度, 保证护理记录的完整性。

1.3 观察指标

统计两组护理风险事件, 并行统计学比较。

1.4 统计学分析

采用 SPSS 20.0 软件, 护理风险事件发生率用 (n, %) 表示, 用 χ^2 检验, 差异有统计学意义用 $P < 0.05$ 表示

2 结果

以护理风险事件发生率为评价指标, 与对照组 (14.81%) 相比较, 观察组 (3.70%) 更低, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。见表 2:

表 2: 两组护理风险事件发生率比较

组别	意外事件	护理缺陷	护理纠纷	护理风险事件发生率 (%)
观察组 (n=27)	1	0	0	1 (3.70)
对照组 (n=27)	1	1	2	4 (14.81)
χ^2	/	/	/	5.546
P	/	/	/	0.027

3 讨论

冠心病患者接受冠状动脉介入术治疗, 虽然创伤小、成功率高, 患者术后恢复得更快, 但是依然存在着不可避免的护理风险, 护理人员应该如何降低护理风险是提高护理质量的重要方向。护理风险管理的应用, 护理人员首先对手术治疗

(下转第 97 页)

比较采用 t 检验；以 P 值 < 0.05 表达组间差异性具有统计学意义。

2 结果

观察组患者风险事件发生率为 3.33% 显著低于对照组的 30.00% (P<0.05)，详见表 1。观察组患者护理满意度评分 (94.33±5.25) 分，高于对照组的 (78.12±4.50) 分 (t=3.5766, P=0.0217)。

表 1: 对比两组手术患者护理风险事件发生率 (n%)

组别	例数	引流管 错位	跌倒	误吸	用药 错误	风险事件 发生率
对照组	30	2	2	4	1	30.00
观察组	30	0	0	1	0	3.33
卡方值						9.2160
P 值						0.0000

3 讨论

由于受到年龄、泌尿外科手术特点、护理工作等因素的影响，泌尿外科高龄手术患者护理工作中有较多的风险因素存在。这就要求护理人员在开展护理工作前对可能出现的危险事件进行全面分析，并制定出相应的处理措施，预先对其中的一些风险进行处理，使风险事件发生率降低，为患者术后

(上接第 93 页)

中可能存在的一些护理风险进行识别，通过对护理风险进行评估，进一步明确护理风险因素造成的危害，针对这些危险因素制定有效的应对措施^[1]。

本次研究中，本院对冠心病患者实施冠状动脉介入术治疗的过程中，给其配合应用了护理风险管理，首先进行了风险识别，分析了造成这些风险因素的原因，其次进行了护理风险进行评估，明确了护理风险可能会造成的不良影响，最后以护理风险为核心，制定了有效的预防措施，整个护理过程体现出了对患者的人文关怀理念，有效的减少了护理过程中

(上接第 94 页)

及时的抢救。新冠疫苗在接种以后会对人体产生一定的保护性抗体，能够在新冠病毒侵入人体时杀灭病毒，让病毒没有办法在体内继续增殖，所以可以达到预防疾病的目的。新冠疫苗分为两针剂和三针剂，一般在接种第二剂疫苗两周后就能够产生非常好的免疫效果。接种新冠疫苗以后可能会出现接种部位红肿、硬结以及疼痛等情况，同时还会伴有全身乏力、发热以及恶心头疼等表现，当出现这些状况时，可以询问相关的医师进行处理。

无缝隙护理管理能够改善患者在接种过程中遇到的问题，提高患者对护理的满意度，同时也能够降低患者接种后出现

(上接第 95 页)

内分泌失调肥胖会带来患者较大的生活与工作压力，尤其是当下人们对形象的要求更高，直接影响在职场、家庭生活、情感交流方面的状况，减肥的市场需求量较大。除了专业的治疗方案，重要的是要保证患者更好的执行。护理工作则可以辅助医生做好患者执行方面的指导与监督，帮助患者建立健康的生活习惯。

总而言之，护理干预应用在内分泌失调肥胖患者中可以有助于其减肥效果的提升，患者满意度也更高。

顺利恢复提供保障。本研究中，针对泌尿外科高龄患者围术期的风险因素进行分析，给予针对性的风险护理管理，组织护士进行培训，有助于增强其护理能力，培养风险预防意识，能够促进护理风险的降低。针对护理高风险环节和时间段制定应急预案，能够有效减少护理危险事件的发生。从术前、术中、术后三个环节入手，实施围术期护理，可提高护理内容的完善性，提高护理风险的预防质量，这对患者护理安全性的提升，同样具有重要价值。对护士进行明确分工，严格执行护理操作流程，并落实奖惩机制，可有效增强护士的风险预防以及护理的谨慎性。加强与患者的沟通交流，该护理措施的实施，可以减少护患纠纷，进一步提高护理的安全性。此次研究中，观察组患者风险事件发生率显著低于对照组 (P<0.05)；护理工作的总满意度显著高于对照组 (P<0.05)，数据说明，泌尿外科高龄患者围手术期实施护理时，加强护理风险管理防范措施，护理安全性更高，患者的护理满意度高，具有临床应用价值。

参考文献

- [1] 翟林敏, 田媛. 护理风险管理在泌尿科高龄手术患者中的应用 [J]. 临床医药文献电子杂志, 2022 (2): 94.
- [2] 王亚娥. 护理风险管理在泌尿外科内镜手术患者中的应用效果 [J]. 中国保健营养, 2019 (32): 177-178.

出现的一些护理风险事件。本次研究结果也显示，与对照组护理风险事件发生率 (14.81%) 相比较，观察组 (3.70%) 更低，进一步证实了护理风险管理的安全性、有效性等优势。

总之，对冠心病患者实施冠状动脉介入术治疗的过程中，给其配合应用护理风险管理，能够有效降低治疗过程中的护理风险事件，建议推广。

参考文献

- [1] 荆松宾, 巴宁, 刘珍英. 护理风险管理在经桡动脉路径冠状动脉介入治疗术后患者中的应用 [J]. 齐鲁护理杂志, 2021, 27(19):151-153.

不良反应的几率，在临床上值得推广和使用。

参考文献

- [1] 薛涛. 新冠肺炎疫苗何时上市. 新浪网, 2021.8.18.
- [2] 贾楠. 新冠肺炎疫苗接种时要注意什么? 哪些人不适合? 这里有您关切的内容 [J]. 北京日报, 2021.1.3.
- [3] 刘佳妮. 中疾控: 新冠肺炎感染者目前暂不建议接种新冠病毒疫苗 [J]. 中国疾病预防控制中心, 2021.1.9.
- [4] 黄远霞, 王顺香, 李慧兰. 无缝隙护理在社区计划免疫预防接种中的应用效果观察 [J]. 中国临床护理, 2021, 10(1): 59-61.

参考文献

- [1] 陈艳秋. 综合护理干预对内分泌失调型肥胖患者减肥效果的影响 [J]. 饮食保健, 2019, 6(51):229-230.
- [2] 陈丽萍. 综合护理干预对内分泌失调型肥胖患者减肥效果的影响 [J]. 智慧健康, 2021, 5(19):133-134.
- [3] 王文婷. 综合护理干预对内分泌失调型肥胖患者减肥效果的影响价值分析 [J]. 医学美学美容, 2021, 28(16):122.
- [4] 杨雪. 综合护理干预对内分泌失调型肥胖患者减肥效果的影响 [J]. 特别健康, 2020, (27):292.