

阑尾炎的症状是什么？有哪些误区？

孙毅川

金堂县中西医结合医院（金堂县土桥镇中心卫生院） 四川成都 610407

【中图分类号】R57

【文献标识码】A

【文章编号】1002-3763 (2022) 12-114-01

作为一种人们日常生活当中常见的疾病，相信很多人对于阑尾炎这种疾病并不陌生，但由于一些流言与传闻的影响，很多人对于阑尾炎这种疾病都在认知上有一定的误区。那么，你了解阑尾炎吗？关于阑尾炎的症状与这些常见误区，你又知道多少呢？

什么是阑尾炎？

阑尾炎是一种在人体内部盲肠与回肠之间的一段细长弯曲的盲管处发生的炎症病变，属于人们日常生活当中的一种常见疾病，有着发病原因复杂、发病突然以及随着时间发展越发严重的特点，这也导致了阑尾炎的治愈效果与能否及时进行治疗有着密切的关系。根据医学调查显示，阑尾炎患者如果能够在发病的初期得到及时的治疗，那么绝大部分的患者都能够在短期内康复；但如果患者长时间未能得到救治，患者就很容易因阑尾炎的发展而出现多种严重的并发症，严重的时候甚至会导致患者的死亡。

阑尾炎的症状表现

通常情况下，阑尾炎患者可以分为四种不同的类型，分别为急性单纯性阑尾炎，急性化脓性阑尾炎、坏疽以及穿孔性阑尾炎和阑尾周围脓肿，不同类型的阑尾炎在症状表现上存在一定的差异。比如，急性单纯性阑尾炎患者的阑尾只有轻微的肿胀，这说明患者的病情相对轻微，症状上往往也仅有程度较轻的腹痛、食欲下降与恶心乏力等；急性化脓性阑尾炎腹部的疼痛将会加重，并且会随着时间的推移发生转移，最后固定在患者的右下腹，同时还会导致患者出现发热、腹肌紧张以及各种消化道症状；穿孔性阑尾炎患者的症状与化脓性阑尾炎患者大致相似但程度更加严重，同时还会额外导致患者面色苍白、脉搏细弱、血压降低等症状的产生；而阑尾周围脓肿的患者则会因为感染的进一步加重而在上述症状外出现腹膜刺激征的表现，此时患者的整个肚皮都会像模板一样僵硬，按压的时候疼痛明显，而且手离开的瞬间会导致疼痛的进一步加重。

阑尾炎防治的误区，看看你中了几条！

1. 饭后运动会导致阑尾炎

俗话说“饭后百步走，活到九十九”，但有很多人在吃饱喝足之后不愿意动弹，还说“饭后运动只会让食物残渣进入阑尾而导致阑尾炎”，那么事实真的如此吗？实际上，在人们吃完饭之后，食物需要在胃部经过第一轮消化，要等到食物从胃里进入肠道至少需要 6 个小时的时间！即使有少部分的食物进入了肠道，这些食物往往也很难在短时间内进入位于盲肠末端的阑尾的。只有那些因为肠道消化功能不好导致食物残渣留在肠道内的人才有可能因食物残渣进入阑尾而引发阑尾炎。

2. 阑尾炎必须手术切除

目前，医学界对于阑尾炎这种疾病最主要的治疗手法就是手术切除，而这也让许多人产生了误解，觉得只要是阑尾炎就要切除，这其实也是一种错误的认知。在临床治疗当中，适合进行手术治疗的往往只有发病初期的单纯性阑尾炎，而如果患者病情轻微的话甚至只需要接受保守治疗；而当患者的阑尾发生了化脓甚至穿孔的时候，为了避免患者症状的过度扩散，医生也是需要先使用保守治疗进行控制之后再使用手术的方式进行切除的。

3. 阑尾炎疼痛只是右下腹疼痛

很多阑尾炎患者在发病的时候会感到肚脐周围甚至是上腹部疼痛，因此在医院确诊为阑尾炎的时候会产生疑问：阑尾不是在人体右下腹的位置吗？为什么会感到上腹部的疼痛呢？实际上，阑尾炎导致的上腹部疼痛是因为此时的阑尾炎没有影响到阑尾的浆膜层，因此这种疼痛并不属于阑尾的疼痛而是一种内脏神经的反射性疼痛，只有当炎症部位影响到阑尾浆膜层的时候才会准确的定位为右下腹疼痛。另外，可能引发右下腹疼痛的疾病也不只有阑尾炎这一种，因此不要一感觉右下腹疼痛就以为是阑尾炎哦！

作为一种常见的急性炎症疾病，阑尾炎的病情严重程度往往会随着时间而越发危险，因此对患者的治疗宜早不宜迟。另外，大部分患者并非医学专业出身，那些认知上的错误很可能会影响医生的治疗。只有密切配合医生的治疗行为，才能更快的从阑尾炎造成的痛苦当中解脱。

（上接第 113 页）

度的运动可以增强患者的抵抗力，同时还可以提高患者的肺部功能，比如进行侧肢抬高锻炼等。

对于术后的患者，早期要多做咳嗽和深呼吸训练以锻炼肺功能，比如患者在咳嗽训练时，要先深吸一口气，然后收腹屏气，进行咳嗽，护理人员可以拍背协助。当患者血压正常，可以采取半卧姿势；术后的第二天，患者可进行四肢屈伸运动；患者病情稳定，可以酌情散步。

2. 戒烟

吸烟能降低患者的肺部防御能力，增高气胸的复发概率，

所以气胸患者一定要戒烟，并要远离二手烟。

3. 避免呼吸道感染

呼吸道疾病可能引起气胸或者气胸复发，因此患者一定要防止呼吸道发生感染。寒冷季节外出时一定要做好保暖措施，戴好口罩、围巾等，感冒高发季节避免去人群密集的场所。

胸痛难忍、呼吸困难，气胸是一种会呼吸的痛，给患者生活带来诸多不便。如果不幸得了气胸，在积极治疗的同时，一定要注意对患者做好护理工作，减少患者气胸的复发概率，让患者早日恢复健康，自由地进行呼吸。