

以家庭为中心的护理模式在完全植入式静脉输液港乳腺癌化疗患者中的应用评价

莫冬 景良洪^{通讯作者}

重庆市人民医院乳腺甲状腺外科 401147

【摘要】目的 研究在完全植入式静脉输液港乳腺癌化疗患者护理期间采用以家庭为中心的护理模式的效果。**方法** 在2021年7月~2022年7月期间选取86例完全植入式静脉输液港乳腺癌化疗患者分成两组,分别给予常规护理模式(对照组)和以家庭为中心的护理模式(研究组)护理,对比患者护理效果。**结果** 研究组患者护理后的自护能力水平更高;研究组患者护理后的不良情绪评分更低;研究组患者护理后的生活质量评分更高,差异有统计学价值($P<0.05$)。**结论** 在完全植入式静脉输液港乳腺癌化疗患者护理期间,以家庭为中心的护理模式可以充分提升护理效果,该护理模式值得普及应用。

【关键词】 完全植入式静脉输液港;乳腺癌;以家庭为中心的护理模式;不良情绪

【中图分类号】 R473.73

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2023) 03-111-02

乳腺癌是乳腺甲状腺外科的多发病和常见病,其往往会对女性乳腺功能与健康造成威胁。在治疗过程中,近年来,随着医疗技术的不断发展与进步,完全植入式静脉输液港在乳腺癌化疗期间得到了广泛的应用^[1]。本文针对在完全植入式静脉输液港乳腺癌化疗患者护理期间采用以家庭为中心的护理模式的效果进行了研究,现整理报道如下。

1 材料与方法

1.1 一般资料

在2021年7月~2022年7月期间选取86例完全植入式静脉输液港乳腺癌化疗患者分成两组,对照组年龄33~61岁,平均 (51.05 ± 3.28) 岁;研究组年龄34~62岁,平均 (51.41 ± 3.30) 岁。差异无统计学价值($P>0.05$)。

1.2 方法

1.2.1 对照组

给予常规护理模式进行护理:①做好植入部位护理。②做好患者病情监测。③落实健康知识宣教。

1.2.2 研究组

给予家庭为中心的护理模式进行护理:在护理过程中,常规内容同对照组。与此同时,医护人员应对患者治疗期间的相应护理要点进行告知并帮助患者家属进一步实现对于护理技巧的有效掌握^[2]。在此期间,应引导患者家属与患者多进行一些沟通和交流,帮助其进一步实现对于紧张情绪的充分消除。与此同时,医护人员应定期对患者病情进行说明并及时告知患者及其家属完全植入式静脉输液港的价值,确保

其积极做好对于患者的充分引导^[3]。在输液结束后,医护人员应及时对肝素冲管和封管的一些操作进行充分展示。

1.3 观察标准

1.3.1 患者自护能力

采用问卷评估,分数越高表示患者自护能力越好。

1.3.2 患者不良情绪

选取焦虑自评量表(SAS)与抑郁自评量表(SDS)评估患者不良情绪,分数越高证明其不良情绪越明显。

1.3.3 患者生活质量

采用生活质量问卷调查,分数越高证明生活质量越好。

1.4 统计学方法

选用SPSS21.0软件处理患者数据, $P<0.05$ 代表差异有统计学价值。

2 结果

2.1 患者自护能力比较

研究组患者护理后的自护能力水平更高($P<0.05$)。见表1。

表1:患者自护能力

组别	n	护理前	护理后
研究组	43	68.07 ± 3.31	92.25 ± 3.25
对照组	43	68.12 ± 3.25	81.46 ± 3.68
t	-	0.071	14.411
P	-	0.944	0.000

2.2 患者不良情绪比较

研究组患者护理后的不良情绪评分更低($P<0.05$)。见表2。

表2:患者不良情绪

组别	n	SAS		SDS	
		护理前	护理后	护理前	护理后
研究组	43	47.70 ± 3.12	20.63 ± 1.42	47.65 ± 3.16	20.45 ± 2.28
对照组	43	47.66 ± 3.22	26.74 ± 1.45	47.59 ± 3.30	27.68 ± 2.14
t	-	0.059	19.742	0.086	15.162
P	-	0.954	0.000	0.932	0.000

2.3 患者生活质量比较

研究组患者护理后的生活质量评分更高($P<0.05$)。见表3。

3 讨论

对于患有乳腺癌的患者而言,化疗是一种较为常用的治疗手段。在治疗期间,通过相关化学药物的应用,医疗人员

可以帮助其有效实现对于癌细胞的杀灭^[4]。近年来,随着医疗研究工作的不断发展,完全植入式静脉输液港在化疗过程中得到了广泛的应用,其进一步促进了患者化疗效果的提升。在这一问题上,大量研究资料表明,与传统护理模式相比,以家庭为中心的护理模式可以进一步结合患者家庭,对于护

理工作进行开展与设计。在此过程中,医护人员可以对患者家属进行相应的引导,从而确保其可以有效做好对于患者的看护与管理,以便有效帮助患者实现对于紧张情绪的充分消除并积极配合护理^[5]。此外,通过在家庭生活中做好与患者之间的情感沟通,患者家属可以帮助其进一步实现对于康复信心的树立,这一点对于患者整体健康的保障具有重要的促进意义,其为完全植入式静脉输液港化疗工作的开展奠定了坚实的基础。

在乳腺癌患者完全植入式静脉输液港化疗期间,以家庭为中心的护理模式可以促进患者自护能力的提升与不良情绪的改善,其对于患者生活质量的优化至关重要。

综上所述,在完全植入式静脉输液港乳腺癌化疗患者护理期间,医护人员应积极结合以家庭为中心的护理模式对患者展开护理。

参考文献:

[1] 谢莹莹.以家庭为中心的护理干预在 VPA 乳腺癌化疗患者的应用效果[J].国际医药卫生导报,2022,28(17):2504-2507.

(上接第 107 页)

药指导、咳血护理、呼吸护理,均能够改善患者的状态,确保呼吸道通畅,给予患者营养支持,加快患者康复的速度。临床各项指标比较,实验组 PCO₂、呼吸频率和心率水平均低于对照组,实验组患者 PO₂ 指标水平高于对照组, $P < 0.05$; 护理期间并发症发生率,实验组低于对照组, $P < 0.05$ 。

综上所述,在重症结核病患者护理中开展综合护理干预,能够从较为全面的角度给予患者治疗优化保障,整个诊疗阶段的安全性改善显著。

参考文献:

[1] 张巧.支持性心理护理对耐药结核病患者病耻感、

(上接第 108 页)

面,已经被众多医疗人士,称为与核心疾病抗衡的关键组成系统,人身心理健康的成长就势必需要良好的心灵,而身心的舒适与和谐,会转化成一个未知系统,把人坚韧的心念化为克服疾病的动力,与自然力量融合为一体,对于血液系统疾病来说的福音^[4]。本研究中,观察组的护理有效率明显高于对照组 ($P < 0.05$),观察组的治疗依从性优于对照组 ($P < 0.05$),说明心理护理具有十分重大的意义,它可以帮助病人以更加积极的心理接受药物,改善病人的依从感,从而达到良好的护理作用。

综上所述,心理护理在血液系统疾病中的应用研究效果显著,可改善患者负面情绪,保障治疗的持续进行,值得推广使用。

(上接第 110 页)

[8] 胡丽波.优质护理服务模式护理对妊娠期高血压患者效果分析[J].航空航天医学杂志,2021,32(07):883-884.

[9] 赵亚敏,李金霞.优质护理在妊娠期高血压综合征产妇产后大出血护理中的效果观察及对舒张压、收缩压水平影响评价[J].中国社区医师,2021,37(20):143-144.

[10] 张秋娥.优质护理在妊娠期高血压产妇产后出血护

[2] 李琳.基于电子病历信息的优质护理在晚期乳腺癌患者植入式静脉输液港化疗期间的护理效果[J].护理实践与研究,2022,19(5):760-764.

[3] 汪金华,林娟,何琴帅,等.细节性护理在乳腺癌行植入式静脉输液港化疗患者中的应用[J].齐鲁护理杂志,2022,28(2):134-136.

[4] 翟青.风险护理管理模式在乳腺癌植入式静脉输液港化疗患者中的应用价值分析[J].现代诊断与治疗,2022,33(10):1563-1565.

[5] 陈伟,夏旭霞,章月照.全程规范化护理体系对乳腺癌植入式静脉输液港化疗患者不良反应的影响[J].中国性科学,2022,31(1):98-101.

表 3: 患者生活质量

组别	n	护理前	护理后
研究组	43	73.72±3.46	91.75±3.28
对照组	43	73.69±3.39	82.66±3.43
t	-	0.041	12.560
P	-	0.968	0.000

效能感及健康行为的影响[J].数理医药学杂志,2022,35(10):1561-1564.

[2] 王方也.优质护理对结核病患者心理情绪及护理满意度的影响[J].中国医药指南,2022,20(23):130-132.

[3] 彭小华.结核病知识宣教在结核病预防和控制中的应用价值评估[J].中国医药指南,2022,20(19):94-96.

[4] 卢平.护理干预在呼吸内科重症结核病患者护理中的应用[J].中国医药指南,2019,17(27):264-265.

[5] 张利君,刘艳,宋艳.医院-家庭联合督导延续性护理模式对耐药结核病患者家庭负担及社会支持的影响[J].护理实践与研究,2022,19(05):631-634.

参考文献:

[1] 张霞.基于聚焦解决模式的心理护理在心脏磁共振检查病人中的应用[J].护理研究,2022,36(1):186-188.

[2] Fu X, Lin L, Huang L, et al. Clinical application of vancomycin population pharmacokinetics model in patients with hematological diseases and neutropenia[J]. Biopharmaceutics & drug disposition, 2021, 42(9):427-434.

[3] 张润琴,王玲花,封钢.积极心理学团体护理干预在康复期双相情感障碍病人中的应用效果研究[J].护理研究,2022,36(3):535-537.

[4] 何春琳,李晓梅,王雅莉.系统规范化联合个性护理对早期宫颈癌患者护理满意度及心理状态影响[J].贵州医药,2021,45(12):1988-1989.

理中的效果及对护理满意度的影响分析[J].中国社区医师,2021,37(18):135-136.

[11] 王靖舒.优质护理干预对妊娠期高血压综合征患者的影响[J].中国医药指南,2021,19(17):199-200.

[12] 唐晓宁.优质护理模式在妊娠期糖尿病合并妊娠期高血压产妇中的应用[J].糖尿病新世界,2021,24(10):137-140.