

分析预警护理管理干预应用于肿瘤患者静脉治疗期间的效果

邓瑜霞

江安县人民医院普外科 644200

【摘要】目的 探讨肿瘤患者静脉治疗期间应用预警护理管理干预的效果。**方法** 以我院 61 例肿瘤患者为研究对象, 然后按照数字随机分配原则将本次研究对象分成观察组 (31 例) 和对照组 (30 例) 两组, 对照组患者静脉治疗期间实施的是常规护理干预方案, 观察组患者在前者的基础上实施预警护理管理干预方案, 对两组患者所实施护理方案取得的效果进行比较。**结果** 观察组患者中出现了 1 例不良反应, 不良反应发生率为 3.2%, 患者护理满意度为 93.5%; 对照组患者中出现了 6 例不良反应, 不良反应发生率为 20.0%, 患者护理满意度为 73.3%, 经统计学软件处理, 两组数据结果显示有较大的差异, 存在统计学意义 ($p < 0.05$)。**结论** 肿瘤患者静脉治疗期间实施预警护理管理干预, 可有效降低不良反应的发生, 提高患者的满意度, 值得应用。

【关键词】 预警护理管理干预; 肿瘤; 静脉治疗; 应用

【中图分类号】 R473.73

【文献标识码】 A

【文章编号】 1005-4596 (2023) 04-105-02

肿瘤是指机体在各种致瘤因子作用下, 局部组织细胞增生所形成的新生物, 伴随着肿瘤疾病的加重, 将会危及到患者的生命。因此, 早发现、早治疗十分重要。静脉治疗肿瘤患者的主要治疗方式之一, 在静脉治疗期间, 因其对血管的损伤较大, 再加上患者心理上的负担, 患者在治疗过程中容易发生一些不良反应, 进而给治疗造成影响。因此, 要想提高治疗效果, 需要对患者进行有效的护理干预。有研究表明^[1-2], 预警护理管理干预在肿瘤患者静脉治疗期间有着显著的价值, 能有效降低不良反应的发生, 提高患者治疗的依从性。对此, 本文特从我院选取 61 例肿瘤患者作了相关探究, 现将具体内容作如下介绍。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究所选 61 例肿瘤患者均选自我院, 患者入选时间为 2022 年 4 月至 2022 年 12 月。经数字随机分配, 61 例患者分成观察组和对照组两组。观察组: 31 例 (男 21 例, 女 10 例), 患者年龄在 39 ~ 76 岁之间, 平均 (57.45 ± 0.25) 岁; 对照组: 30 例 (男 19 例, 女 11 例), 患者年龄在 41 ~ 77 岁之间, 平均 (59.05 ± 0.35) 岁。所有患者均接受静脉治疗, 两组患者在年龄、性别等一般资料比较, 统计结果显示差异不大, 无统计学意义 ($p > 0.05$)。

1.2 方法

对照组患者实施的是常规护理方案, 主要包括用药指导、病情监测等, 观察组患者在前者基础上实施预警护理管理干预方案, 具体内容如下:

1.2.1 成立预警小组

小组成员由一名专业医师、一名护士长、4 名护士组成, 该小组负责搜集相关资料, 寻找肿瘤患者静脉治疗期间易发生并发症的风险, 并制定护理对策。另外, 小组成员上岗前需要进行培训, 确保他们掌握科学的护理技能。

1.2.2 心理指导

静脉治疗前, 护士与患者进行沟通, 了解患者的心理状态, 对患者进行针对性的心理指导。对有焦虑心理的患者, 对其进行安抚和慰问; 对有恐惧心理的患者, 向其普及疾病相关知识, 让他们指导治疗的科学性, 从而争取他们的主动配合。

1.2.3 导管监测

在留置静脉导管时, 密切对导管进行监测, 观察导管是否有脱管、堵塞等问题, 发现问题时要立即处理。

1.2.4 体位指导

在患者治疗期间, 根据患者的病情, 指导患者置于舒适的体位, 让患者感受舒适, 减少不适。同时, 为了减少同一体位长时间带来的不适, 要定时调整患者体位, 使其保持舒适的休息姿态。在调整患者体位时, 要避免触碰患者伤口。

1.3 判定指标

记录患者在静脉治疗期间发生的不良反应, 同时以我院自制的护理满意度调查表对患者进行护理满意度随访, 由患者对本次护理工作满意度评定。比较两组患者的不良反应发生率及护理满意度。

1.4 统计学分析

应用统计学软件 SPSS22.0 处理本次研究, 统计得出的数据结果用 t 检验, 计量资料用 ($\bar{x} \pm s$) 表示, $p < 0.05$ 表示有统计学意义。

2 结果

观察组患者中出现了 1 例不良反应, 不良反应发生率为 3.2%, 患者护理满意度为 93.5%; 对照组患者中出现了 6 例不良反应, 不良反应发生率为 20.0%, 患者护理满意度为 73.3%, 经统计学软件处理, 两组数据结果显示有较大的差异, 存在统计学意义 ($p < 0.05$), 如表 1。

表 1: 两组患者不良反应发生率及护理满意度比较

组别	例数	不良反应 (%)	护理满意度 (%)
观察组	31	1 (3.20)	29 (93.5)
对照组	30	6 (20.0)	22 (73.33)
P			< 0.05

3 讨论

肿瘤作为临床比较常见的疾病, 针对这类疾病, 许多患者会出现一些消极的心理, 一旦出现这些心理, 就会给疾病的治疗造成不利。还有就是肿瘤患者静脉治疗期间需要注意的事项较多, 稍有不慎, 就容易引发不良反应, 给患者健康造成影响。我院对肿瘤患者在静脉治疗期间实施预警护理管理干预后取得了显著效果, 有效地促进了患者的健康, 提高了患者的生活质量。

护理是临床疾病治疗不可或缺的一部分, 有效的护理对患者的康复有着促进作用。预警护理管理干预就是对护理中存在的风险进行识别和分析, 并提前加以预防, 目前已经广泛应用于医护领域^[3]。针对肿瘤患者, 其在静脉治疗期间容易

(下转第 108 页)

需要给予患者情感支持,帮助他们克服病痛和不便,并鼓励他们遵守医嘱和卫生习惯,以减少病情加重和传染风险^[1]。需要特别注意有关事项,尊重患者和家属的感受和意愿,不要强加自己的看法和决策。遵守保密原则,保护患者和家属的隐私权。不断学习和更新知识,提高心理护理的专业水平。在必要时,转介患者和家属至专业心理医生或心理咨询师进行更深入的心理干预和治疗^[2]。

健康教育则可以提高公众对水痘的认识和预防意识。对于未感染过水痘的人群,需要加强宣传和教,提高他们的防护意识和接种疫苗的意识。同时,通过科学和可靠的信息传递,可以减少误解和恐慌,提高公众对水痘的理性认识和应对能力。在操作中需要特别注意有关问题,针对不同患者和家属,选择合适的健康教育方法和形式,进行针对性的教育和指导。健康教育内容应该科学、准确、实用,避免误导和偏见^[3]。健康教育应该与患者和家属的实际情况相结合,根据不同的

健康需求和问题,提供个性化的教育和指导。健康教育应该注重互动和反馈,让患者和家属参与到健康教育中来,掌握健康知识和技能。健康教育应该持续和跟踪,监督患者和家属的健康管理和生活方式调整,及时纠正不良习惯和行为。

总而言之,水痘患者中运用综合健康教育与心理护理后,可以有效的提升患者治疗依从性,改善患者负面情绪,整体状况更为理想。

参考文献

[1] 黄贝真,周维芬,林丽容.程序化护理联合心理干预在小儿水痘治疗中的应用[J].齐鲁护理杂志,2021,27(11):152-154.
 [2] 季媛,黄慧懿,周旻佳.循证护理结合流程再造在成人水痘患者中的应用[J].齐鲁护理杂志,2021,27(23):162-164.
 [3] 赵惠琴.探讨水痘疾病患者的护理及预防措施[J].婚育与健康,2022,28(12):99-100.

(上接第104页)

肺炎是一种常见疾病,多因病原菌感染与免疫损伤等多种因素导致肺泡、气道、肺间质有炎症损伤发生,继而形成疾病^[2]。该病起病急骤,病情变化速度快,容易发展为重症肺炎。若重症肺炎患者属于儿童,不仅会威胁身体健康,还会对生命安全造成严重威胁^[3]。人性化护理干预是呼吸内科及儿科十分青睐的现代化护理,主张以患儿为中心,护理前充分明确患儿的年龄、个性与身心状态,基于常规化护理干预,做好护理的精与细,优化护理操作,改进护理措施,提高护理科学性。

综上所述,小儿肺炎患者治疗期间采用人性化护理干预,值得临床推广。

参考文献

[1] 许雪萍,卜翠萍.小儿肺炎的人性化护理效果评价[J].全科护理,2014(31):2910-2911,2912.
 [2] 温连连.人性化护理在小儿肺炎护理中的应用[J].中国校医,2018,32(3):224-225.
 [3] 李乐.小儿重症肺炎监护病房实施人性化护理干预临床观察[J].社区医学杂志,2017,15(6):80-81.
 [4] TUGCE TURAL-KARA, HALIL OZDEMIR, NIHAN Y?LD?Z, et al. Underlying Diseases and Causative Microorganisms of Recurrent Pneumonia in Children: A 13-Year Study in a University Hospital[J]. Journal of tropical pediatrics.,2019,65(3):224-230.

(上接第105页)

出现各种不良并发症,如液体渗出、静脉炎等,而实施预警护理管理干预,通过护理风险的识别和风险评估,有针对性地进行护理干预,可有效降低不良并发症的发生^[4]。通过此次研究发现,预警护理管理干预在肿瘤患者静脉治疗中发挥着积极的作用,对患者的健康有着促进作用,值得推广。

参考文献

[1] 崔静,慕华.护理风险管理在经外周静脉穿刺中心静脉置管治疗的肿瘤患者中的应用效果[J].临床医学研究与实

践,2022,7(12):178-180.

[2] 李芳,黄刚强.预警式护理在下肢深静脉血栓介入治疗患者中的应用[J].实用临床护理学电子杂志,2020,5(12):136.
 [3] 杜小彬.肿瘤患者静脉治疗期间应用预警护理管理干预的效果[J].山西职工医学院学报,2019,29(02):124-126.
 [4] 林小梅.针对性护理在经外周静脉穿刺中心静脉置管肠外营养支持治疗胃肠肿瘤患者中的应用[J].医疗装备,2019,32(03):158-159.

(上接第106页)

不及时予以相应的治疗措施,或者使患者血压水平长期处于较高区间,会导致相关并发症出现,对患者生命安全产生一定威胁,因此提供治疗干预具有重要意义,并予以相应的护理措施,可改善患者预后状况^[2]。

此次分析显示:治疗后实验组治疗效果、血压水平检测值较参照组更佳(P<0.05),由此说明,高血压治疗而言,耳穴贴压的应用疗效更为显著,且安全性高。原因分析:中医认为高血压的发生是因为机体的阴阳失衡,比如肝肾阴虚、肝阳上亢,所以治疗需以阴阳平衡调整,来改善患者的脏腑功能。耳廓中的穴位或者是敏感点与各部位器官相对应,利用刺激耳穴能有效防治器官疾病,此次研究选用王不留行籽,其本身有着一定的活血化瘀效果,发挥利尿通淋及通经活血

的作用,以耳穴贴压方式开展可以实现平肝降压的效果,同时结合护理实施,在改善患者身体状态的同时,确保治疗工作的顺利进行。

综上,耳穴贴压用于高血压病治疗效果明显,对患者的血压水平改善显著,值得推荐。

参考文献

[1] 连艳玲,陈薇薇,张洪,等.耳穴贴压治疗痰湿壅盛型轻中度高血压的临床疗效观察[J].中西医结合心脑血管病杂志,2019,17(9):1371-1373.
 [2] 刘静娜,谢学慧,曹桂娟,等.耳穴贴压法治疗在老年人原发性高血压护理中的应用及对血压水平的影响[J].国际护理学杂志,2020,39(22):4095-4099.