

急诊护理路径对急性脑卒中患者急救时间及预后的影响观察

陆林英 何瑞洁

南京中医药大学附属苏州市中医医院急诊科 江苏苏州 215007

【摘要】目的 评价急诊护理路径在急性脑卒中病情干预阶段的应用效果。**方法** 研究样本收录时间为2022年5月到2023年2月共计120例急性脑卒中患者作为医学调研样本，基于入组时间顺序，分为对照组与干预组，评价急诊护理路径，在急性脑卒中病情干预阶段的应用价值。**结果** 急诊护理路径措施的开展，在急诊脑卒中患者及病情急救效率方面应用价值显著，显著缩短了急诊耗时与抢救耗时，优化了病情干预效率，缩短住院时间，提升病情干预效率（ $P < 0.05$ ）；通过急诊护理路径措施的开展，进一步优化了急诊脑卒中中的急救效率，急救质量，综合性保障了患者病情改善效果的有效优化（ $P < 0.05$ ）。**结论** 相关医学研究结果，综合性表明了急诊护理路径措施的开展，使得急性脑卒中急救效率急救质量综合性优化，有效改善了急性脑卒中中的病理表现，使得患者生理状态改善效果综合性提升，有重要的应用价值。

【关键词】 急诊护理路径；急性脑卒中；急救时间；预后影响

【中图分类号】 R473

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2023) 05-124-02

急性脑卒中是一种常见的危及生命的脑血管疾病，采用急诊护理路径的方法可能对患者的急救时间及预后产生影响，采用急诊护理路径的方法可以让医务人员更快地对患者进行处理，并能够有效缩短急救时间。这可以最大程度地减少因脑卒中而导致的不可逆性神经系统损害，提高治疗效果采用急诊护理路径的方法可以优化脑卒中的治疗和护理，降低并发症的发生率，为患者提供更好的治疗和康复机会^[1-2]。本次调研中，评价急诊护理路径对急性脑卒中患者的应用价值，详见下文。

1 临床资料

研究样本收录时间为2022年5月到2023年2月共计120例急性脑卒中患者作为医学调研样本，基于入组时间顺序，分为对照组与干预组，单组60例，一般资料分析中，男女比例分别为25:35与28:32，平均年龄分别为55.37±2.65岁与55.39±2.48岁，一般资料平衡，调研数据有对比价值。

2 方法

对照组在急救阶段进行传统护理干预。干预小组实施急救护理路径措施，护士长为急救护理路径措施组长，4-6名护理人员为团队成员的急救护理路径小组，根据急救工作经验和相关资料总结急救护理路径规划量表，定期进行培训，提

高急救护理路径工作阶段护理技能地对护理团队成员进行考核，同时出诊过程中可通过电话等信息手段了解患者病理情况，远程急救人员到达现场后，可更快完成紧急医疗干预的实施，完成信息反馈，由院内急诊科做好相关接待准备；急诊入院后10min内完成供氧、生命体征监测、静脉通路开通等基础管理措施，10min内采集血样检测，给予基础治疗药物干预；经检查确诊为心肌梗死，及时使用相关急救药物干预，降低心肌耗氧量，做好医疗干预措施准备，改善患者病情。

观察指标：完成急救效率各项指标评估完成，急诊质量评价分析对比。

数据处理软件：SPSS25.0；计量资料、计数资料数据格式统一为 $[\bar{x} \pm s, (n, \%)]$ ，由T值、 χ^2 值完成数据校验，存在统计学意义表示为 $P < 0.05$ 。

3 结果

3.1 急救效率评价

急诊护理路径措施的开展，在急诊脑卒中患者及病情急救效率方面应用价值显著，显著缩短了急诊耗时与抢救耗时，优化了病情干预效率，缩短住院时间，提升病情干预效率（ $P < 0.05$ ），详见表1。

表1：急救效率评价（ $\bar{x} \pm s$ ）

组别	例数	急诊耗时 (min)	抢救耗时 (min)	经济花费 (元)	住院时间 (d)
对照组	60	21.42±2.12	15.43±1.52	1024.33±99.32	7.35±0.75
干预组	60	10.31±1.05	8.41±0.81	558.51±55.13	5.41±0.51
T	-	35.3077	31.5712	23.8581	19.5585
P	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

3.2 急诊质量评价

通过急诊护理路径措施的开展，进一步优化了急诊脑卒

中的急救效率，急救质量，综合性保障了患者病情改善效果的有效优化（ $P < 0.05$ ），详见表2。

表2：急诊质量评价（ $\bar{x} \pm s$ ）

组别	例数	入院时NIHSS	出院时NIHSS	入院时GCS	出院时GCS
对照组	60	25.42±2.35	17.31±1.71	5.42±0.52	7.55±0.71
干预组	60	25.62±2.35	12.44±1.25	5.55±0.55	9.41±0.94
T	-	0.5349	30.4988	1.4190	11.5729
P	-	0.5939	0.0000	0.1585	0.0000

4 讨论

急诊护理路径可以增加患者在预定时间内接受最佳治疗

的机会，提高治疗的准确性和效率，预测其预后，并且在康复期内提供必要的护理指导和支持，帮助患者恢复生活的能

力。采用急诊护理路径的方法可以减少医疗资源的浪费,避免各种不必要的检查和治疗程序。这有利于减少医疗机构的运营成本,同时缩短患者就医时间并促进病床周转。采用急诊护理路径的方法对急性脑卒中患者可能产生积极的影响,包括缩短急救时间、降低并发症率、提高预后、减少医疗资源的浪费等等,可积极推广急诊护理路径,提高急性脑卒中患者的治疗效率和康复水平^[3-4]。急诊护理路径措施的开展,在急诊脑卒中患者及病情急救效率方面应用价值显著,显著缩短了急诊耗时与抢救耗时,优化了病情干预效率,缩短住院时间,提升病情干预效率;通过急诊护理路径措施的开展,进一步优化了急诊脑卒中的急救效率,急救质量,综合性保障了患者病情改善效果的有效优化;相关医学研究结果综合性佐证了急诊护理路径措施的开展,更好地优化了急诊科的工作效率,使得急性脑卒中病情抢救与医疗干预措施开展的应用价值进一步提升^[5]。

综上所述,在提高急性脑卒中病情干预质量方面,落实急诊护理路径干预模式,进一步优化急性脑卒中急诊干预

段的各项措施,使得病情干预效率与干预质量显著改善,有重要的应用价值。

参考文献:

- [1] 蔡雪丹.急诊护理路径对急性脑卒中患者急救时间及预后的影响[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生, 2022, 7(1):0053-0055.
- [2] 叶红梅,徐建如,王海燕.急诊护理路径对急性脑卒中患者抢救效果的影响[J]. 医药前沿, 2020, 10(28):191-193.
- [3] 黄丽娟,陈飞霞,梁秀芳.规范化急诊卒中护理路径对急性缺血性脑卒中治疗时间窗的影响[J]. 饮食保健, 2021, 7(46):224-226.
- [4] 孙毅,庆萍萍.急诊护理快速通道对急性脑卒中患者救治时间及治疗效果的影响[J]. 中西医结合护理(中英文), 2021, 7(7):100-102.
- [5] 王璐,马敬.探究急诊护理快速通道对急性脑卒中救治时间及治疗效果的影响效果[J]. 饮食保健, 2021, 5(16):187-187.

(上接第 122 页)

概率,从而减少并发症出现的概率。同时,护理人员对患者进行评估,通过与患者家属充分沟通,掌握患者因疼痛而哭闹的情况,积极寻求解决办法,防止感染、渗血等情况的出现。

本研究结果显示:研究组患者满意度高于对照组,差异比较具有统计意义,临床护理路径运用小儿静脉留置针患者,可提高患者及其家属满意度,在临床上具有一定推广价值。究其原因:护理人员带领患者熟悉医院环境,避免其处于陌生环境而产生的焦虑情绪,减少在穿刺过程中患者配合度差的情况。同时,在实施穿刺前与患者家属进行沟通,将穿刺的重要性、目的以及风险等告知患者家属,积极与其沟通,及时疏导其紧张、抑郁的情绪,避免家属不良情绪影响到患者情绪,可降低患者的抗拒心理,减少穿刺的次数,从而提高患者满意度。

(上接第 123 页)

血气分析等方面进行定期监测,及时发现并预防并发症的发生,如心律失常、心肌梗死扩展和心源性休克等。通过对患者进行心理护理、生理护理和饮食管理等方面的干预,预见性护理可以促进患者的康复,提高患者的生存质量和满意度。预见性护理干预可以根据患者的病情变化,及时调整医疗计划和治疗方案,有效利用医疗资源,减轻医护人员的工作负担,提高医疗效率。通过对患者进行早期干预和有效监测,预见性护理可以减少并发症的发生,降低患者的住院时间和治疗费用,有效降低医疗成本。

急性心肌梗死患者中采用预见性护理干预的未来发展趋势主要包括以下几个方面:随着人工智能技术的不断发展,预见性护理干预将与人工智能技术的融合更加紧密,以建立更为精确和有效的预测模型和干预方案。患者的病情和生理特征各不相同,因此,未来的预见性护理干预将更加注重个性化定制,以提高治疗效果和生存质量。预见性护理干预需要依赖多学科的专业技术支持,未来的发展趋势将更加注重

综上所述,临床护理路径运用小儿静脉留置针患者,可减少患者并发症出现情况,从而提高满意度,在临床上具有一定推广价值。

参考文献:

- [1] 司书红.临床护理路径在小儿静脉留置针穿刺护理效果分析[J]. 中外医疗, 2021, 40(13):110-112+115.
- [2] 杨诗月,雍彩霞,席慧菊.临床护理路径在小儿静脉留置针穿刺护理中的应用效果[J]. 检验医学与临床, 2020, 17(07):974-976.
- [3] 林欣.小儿腹泻护理中临床护理路径的应用评价[J]. 广西中医药大学学报, 2022, 25(05):71-73.
- [4] 谭敏,高玉梅.临床护理路径在小儿支气管炎患者中的效果及对凝血功能的影响[J]. 血栓与止血学, 2022, 28(03):695-696.

多学科协作,以完善患者治疗方案。随着移动医疗技术和远程医疗技术的不断发展,未来预见性护理干预可以通过移动设备和远程医疗平台实现远程监测和诊疗,以提高医疗效率和患者的舒适度。

总而言之,急性心肌梗死患者中采用预见性护理干预后,可以有效的改善患者负面情绪,提升患者护理满意度,整体状况更好。

参考文献:

- [1] 骆淑娥,戴若竹.预见性护理在急性心肌梗死并发心律失常患者的效果分析[J]. 中国卫生标准管理, 2022, 13(8):175-178.
- [2] 李真.预见性护理在急性心肌梗死合并心律失常患者临床护理中的应用效果观察[J]. 航空航天医学杂志, 2022, 33(12):1499-1502.
- [3] 陈燕青,郭燕鸿.预见性护理对急性心肌梗死合并心律失常患者预后效果的影响[J]. 心血管病防治知识, 2022, 12(15):68-70.