

脑出血后偏瘫的生活管理注意事项

阮锦标

南宁市红十字会医院 530012

〔中图分类号〕R743.34 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165(2023)08-087-01

高血压是一种常见的慢性疾病，老年人尤其容易患上高血压。除了药物治疗外，生活方式的调整也非常重要。让我们来了解一下老年高血压患者的生活禁忌和注意事项。

1. 饮食禁忌：老年高血压患者应避免高盐、高脂、高胆固醇的饮食。他们应该减少食用盐、油脂和糖分，增加蔬菜、水果、全谷物和低脂肪的食物摄入。此外，他们还应该限制咖啡因和酒精的摄入。

2. 运动禁忌：老年高血压患者应该进行适度的体育锻炼，但需要避免剧烈运动和过度劳累。他们可以选择散步、慢跑、太极拳、瑜伽等有氧运动，以及适量的力量训练。在开始运动前，最好咨询医生的建议。

3. 吸烟和饮酒禁忌：老年高血压患者应该戒烟和限制饮酒。吸烟和饮酒会增加血压升高的风险，对心血管健康有害。

4. 压力管理：老年高血压患者应该学会有效地管理压力和情绪。长期的压力和焦虑会导致血压升高。他们可以尝试放松技巧，如深呼吸、冥想、温水浸泡等，以缓解压力和焦虑。

5. 定期监测血压：老年高血压患者应该定期监测血压，以确保血压控制在正常范围内。他们可以购买家用血压计，定期测量血压，并将记录带给医生进行评估和调整治疗方案。

6. 保持健康体重：控制体重对于高血压的管理非常重要。过重或肥胖会增加心脏负担，导致血压升高。老年高血压患者应该通过合理的饮食和适度的运动来维持健康的体重。

7. 规律作息：保持规律地作息时间对于高血压的管理也很重要。老年高血压患者应该保持充足的睡眠，并避免过度疲劳和长时间的体力劳动。

8. 控制血脂和血糖：老年高血压患者通常伴随着血脂和血糖的异常。控制血脂和血糖水平对于心血管健康至关重要。他们应该遵循医生的建议，合理控制饮食，定期监测血脂和血糖水平。

9. 避免过度用力：老年高血压患者应该避免过度用力，特别是在举重、搬运重物或剧烈运动时。这些活动可能会导致血压升高，增加心脏负担。

10. 定期复查和随访：老年高血压患者应该定期复查血压和进行相关检查。他们应该与医生保持良好的沟通，及时

报告任何不适或变化，并按照医生的建议进行随访。

11. 减少咖啡因摄入：咖啡因可以导致血压升高，所以老年高血压患者应该限制咖啡因的摄入。咖啡、茶、巧克力和一些软饮料中都含有咖啡因，所以要注意控制这些食物和饮料的摄入量。

12. 控制钠摄入：钠是导致高血压的一个重要因素，所以老年高血压患者应该限制钠的摄入。他们可以选择低钠食物，避免食用加工食品、罐头食品和咸味零食。

13. 增加钾摄入：钾可以帮助降低血压，所以老年高血压患者可以增加钾的摄入。一些富含钾的食物包括香蕉、土豆、西红柿、菠菜和豆类等。

14. 控制饮水量：老年高血压患者应该控制饮水量，避免过多的液体摄入。过多的液体摄入可能导致血压升高。

15. 避免过度用药：老年高血压患者应该遵循医生的建议，按时服药，并避免过度用药。过度用药可能导致血压过低，引起头晕、乏力等不适症状。

需要注意的是，老年高血压患者的生活禁忌和注意事项应该在医生的指导下进行，并且需要根据个体情况进行个体化的调整。每个人的高血压可能有不同的原因和表现，因此生活方式的调整需要根据具体情况进行调整。因此，不能盲目地学习其他患者的方法与经验，要从实际个人情况出发，多参考医生的专业指导，多依据有关专业检查手段来确定自身的病情状况，更好地设定合理的疾病控制方案。

总结起来，老年高血压患者的生活禁忌包括避免高盐、高脂、高胆固醇的饮食，限制咖啡因和酒精的摄入，减少咖啡因摄入，控制钠摄入，增加钾摄入，控制饮水量，避免过度用药。适度的体育锻炼，戒烟和限制饮酒，有效管理压力和情绪，定期监测血压。重要的是要在医生的指导下进行生活方式的调整，并根据个体情况进行个体化的调整。这些生活禁忌和注意事项的遵守可以帮助患者和家属更好地管理高血压，提升生活管理的安全性，并辅助药物治疗发挥更好的作用。老年高血压患者的生活禁忌和注意事项包括重要的是要在医生的指导下进行生活方式的调整，并根据个体情况进行个体化的调整。

(上接第 86 页)

下含服硝酸甘油的方式进行缓解，必要的情况下需要拨打 120 或前往医院就诊。

3 体会

通常情况下，急性发作期的心绞痛需要住院接受治疗，除了这个时间，其他院外时间通过自行服药的方式进行治疗就可以，在总体治疗工作中，心绞痛的预防具有重要意义，患者要对如何进行心绞痛的预防及如何进行心绞痛的治疗进

行准确掌握。住院过程中，作为护理人员，做好患者的日常治疗和护理是一方面，另一方面还要强化宣教心绞痛的防治，方便患者可以在院外对心绞痛的发作进行较好的控制。对患者的心理活动和精神需求要充分了解，根据其实际需要制定科学适宜且合理的护理方案。护理人员和患者之间要保持良好的配合，以保证护理效果，预防和减少并发症的发生，提升生活质量预后。