

桂林市 0-3 岁婴幼儿入托意愿分析

卢艳云 马 丽^{通讯作者}

桂林市妇幼保健院 广西桂林 541001

〔摘要〕目的 了解桂林市 0-3 岁婴幼儿家庭照护服务的特征及影响因素。方法 采用自编问卷，以桂林市 0-3 岁婴幼儿家长为调查对象，通过随机抽样调查，收集婴幼儿照护服务相关资料，分析特征及影响因素。结果 调查结果显示，孩子越多、年龄越大、父亲工作时间越长、所在社区及周边托育机构资源越丰富，家长更愿意将孩子送至托育机构接受照护 ($P<0.05$)。结论 桂林市不同家庭背景在婴幼儿照护服务需求上存在差异，提示应以家庭意愿为导向，大力发展多元普惠托育、鼓励提供多样化托育服务、多途径规范托育机构管理、增强家庭科学育儿能力，不断提升照护服务质效，为婴幼儿健康成长保驾护航。

〔关键词〕婴幼儿照护；需求分析；调查研究

〔中图分类号〕G618 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165 (2025) 07-164-02

生命早期 1000 天是个体生理、心理发育最为关键的阶段。高质量的中心化养育对于父母及儿童具有至关重要的作用^[1]。3 岁以下婴幼儿托育服务是《“健康中国 2030”规划纲要》的重要内容，2019 年，国务院出台《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》指出，要坚持“家庭为主，托育为主，政策引导，普惠优先”基本原则，全面完善婴幼儿照护服务的相关政策和供给。截止 2024 年底，桂林市托位总数 20884 个，每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数 4.22 个，托位使用率为 51.21%，3 岁以下婴幼儿入托率仅为 17.03%，供需矛盾较为突出^[2-3]。随着桂林市出生人口下降，一大批托育机构面临运营困难的局面。因此，亟需分析不同因素与家长托育意愿之间的关系，并结合当前支持政策、供需现状，为健全桂林市婴幼儿托育服务体系提供参考。

1 研究设计

1.1 调查对象与内容

课题组通过《桂林市 0-3 岁婴幼儿家长对托育服务的需求调查问卷》，对桂林市内育有 3 岁以下婴幼儿的家长进行调查。本研究中涉及的照护服务选择分为：已入托或已计划入托和未入托或未计划入托两种情况。

1.2 调查方法

本研究采用随机抽样方法，由桂林市婴幼儿照护指导中心下发调查文件至各县区，通过问卷星向全市范围内的 0-3 岁婴幼儿家长发放，共收回问卷 981 份，其中有效问卷 975 份，有效回收率为 99.39%。

1.3 质量控制

研究设计阶段，通过文献研究、专家咨询、问卷预调查等方式，验证和完善调查方案与问卷。实施阶段，加强组织领导，由桂林市婴幼儿照护指导中心发文，各县区协助，确保调查顺利开展，同时后台实时监测问卷回收情况。资料整理与分析阶段，安排专人对问卷进行清理和逻辑核查，保证数据的可靠性和有效性。

1.4 数据整理与分析

问卷回收后，利用 SPSS 26.0 进行统计分析，计数资料

用例数 (%) 描述，组间比较采用 χ^2 检验，托育服务选择相关因素分析采用二元 Logistic 回归分析。 $P<0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 研究结果

2.1 0-3 岁婴幼儿入托意愿

本次调查家庭中，66.98% (653/975) 已入托或准备入托，33.02% (322/975) 未将或不准备送往托育机构照看。

2.2 0-3 岁婴幼儿家庭入托意愿的相关因素分析

2.2.1 0-3 岁婴幼儿家庭托育服务选择的相关因素分析单因素分析。将家庭结构、月总收入、孩子个数、最小孩子年龄、性别、父母亲年龄、受教育程度、职业类型与是否选择送托进行单因素分析，结果显示孩子个数、最小孩子年龄、父亲工作时间、所在社区及周边托育机构资源情况变量有统计学意义 ($P<0.05$)。

2.2.2 二元 Logistic 回归分析

将上述有统计学意义的变量与是否选择送托进行二元 Logistic 回归分析，家庭孩子越多 ($OR=3.396$, 95% CI : 1.621-7.117)、孩子年龄越大 ($OR=2.813$, 95% CI : 1.347-5.873)、父亲的工作时间越规律 ($OR=2.526$, 95% CI : 1.321-4.831)、所在社区及周边托育机构资源越丰富 ($OR=0.047$, 95% CI : 0.019-0.118) 越愿意将孩子送入托育机构。

3 讨论

本调查表明，66.98% 的家庭已入托或已计划入托，而 33.02% 则未入托或不打算入托。深入探究发现，孩子数量、孩子年龄、父亲工作时长以及周边托育机构资源状况都会对托育服务的选择意愿产生影响。本研究显示，孩子数量是家庭送托行为选择的关键考量因素之一。孩子数量越多，家庭照护成本就越高，养育者难以兼顾，更倾向于把孩子送去托育机构。随着孩子月龄增长，面临工作压力时，养育者更愿意把孩子送到托育机构。

本研究结果显示，56.20% 的家庭期望月均托育费用在 1000 元以下，这充分反映出桂林市婴幼儿家庭对普惠托育服务的强烈需求。73.66% 的家庭选择 2 岁之后送托，家庭更偏爱全日制早送晚接模式，这样更契合职场父母的上下班时间，也可能是认为全日制更有利于孩子的管理与照护。家庭更希望机构照护人员具备大专及以上学历，鉴于婴幼儿身心发展

作者简介：卢艳云，性别：女，民族：汉族，籍贯：广西桂林，学历：本科，职称：副主任护师，科室：婴幼儿照护服务指导中心，研究方向：婴幼儿照护。

的特殊性，家庭对其有更高的专业要求，其服务能力和技术水平不容小觑^[4]。

本研究运用横断面调查方法，分析桂林市 0 - 3 岁婴幼儿家庭照护服务需求特征，然而没有对“接受托育服务”与“未接受托育服务”的儿童体质状况展开进一步深入调研，在未来开展随访研究时，可以增加儿童体质状况的调查内容，为桂林市婴幼儿养育照护医育结合工作的调整提供依据。

[参考文献]

[1] 赵丹. 0-3 岁婴幼儿家庭托育服务需求现状及影响因素

分析[J]. 教育观察, 2023(6):4-7.

[2] 韦铃铃, 朱银燕, 许华英, 等. 福建省 3 岁以下婴幼儿托育服务需求现状分析[J]. 福建医科大学学报(社会科学版), 2022, 23(4):23-29.

[3] 仲冬艳, 陆菊珍. 苏州市姑苏区 3 岁以下婴幼儿托育服务现状调查分析[J]. 中国妇幼保健, 2023, 38(20): 3988-3991.

[4] 熊萍, 蒲杰, 张亚果, 等. 基于家庭视角的婴幼儿照护服务现状及需求分析[J]. 江苏卫生事业管理, 2024, 35(1):144-148.

表 1 0-3 岁婴幼儿家庭入托意愿的二元 Logistic 回归分析 (n=975)

变量	B	标准误差	瓦尔德	自由度	显著性	OR	OR 的 95% 置信区间	
							下限	上限
孩子个数								
1 个 *			13. 052	2	. 001			
2 个	. 106	. 248	. 182	1	. 669	1. 112	. 684	1. 807
3 个及以上	1. 223	. 377	10. 492	1	. 001	3. 396	1. 621	7. 117
最小孩子的月龄								
0-6 月 *			32. 677	5	. 000			
7-12 月	-. 162	. 507	. 102	1	. 750	. 851	. 315	2. 299
13-18 月	-. 639	. 488	1. 716	1	. 190	. 528	. 203	1. 373
19-24 月	. 363	. 502	. 523	1	. 470	1. 438	. 537	3. 849
25-30 月	1. 388	. 428	10. 498	1	. 001	4. 008	1. 731	9. 281
31-36 月	1. 034	. 376	7. 579	1	. 006	2. 813	1. 347	5. 873
父亲的工作时间 *								
自由职业、个体			8. 944	3	. 030			
早八晚五 / 早九晚五	. 927	. 331	7. 852	1	. 005	2. 526	1. 321	4. 831
倒班 (夜班、早班倒班或三班倒)	. 705	. 401	3. 092	1	. 079	2. 024	. 922	4. 442
其他	. 869	. 441	3. 886	1	. 049	2. 385	1. 005	5. 658
您所在社区及周边托育机构资源								
非常丰富 *			54. 389	2	. 000			
一般	-1. 744	. 278	39. 314	1	. 000	. 175	. 101	. 302
完全没有	-3. 062	. 473	41. 822	1	. 000	. 047	. 019	. 118

(上接第 162 页)

的试验结果。由上可知，对支气管哮喘患者实行健康教育能大幅提升其健康知识掌握度和护理满意度，建议将这一护理方式在临床中推广应用。

[参考文献]

[1] 李秀梅. 支气管哮喘的健康教育的探讨[J]. 内蒙古中医药, 2024, 43(3):134-134.

[2] 周彩兰, 耿爱香. 系统强化健康教育对支气管哮喘患

者生活质量的影响[J]. 济宁医学院学报, 2025, 48(3):199-200.

[3] 王豫. 社区健康教育对支气管哮喘病人生活质量的影响[J]. 护理实践与研究, 2023, 20(8):128-129.

[4] 赵启君, 尉希凤. 健康教育对支气管哮喘患者自我保健能力的影响[J]. 中国现代药物应用, 2023, 17(22):177-177.

[5] 何良爱, 何良燕, 何良辉, 等. 健康教育对支气管哮喘患者病情控制水平影响的研究[J]. 中国实用护理杂志, 2023, 39(11):9-13.

(上接第 163 页)

($P<0.05$)，表明采用 U 型硅胶条覆盖的简易集尿器患者能显著降低住院期间各种并发症，减少住院天数。提高患者的生活质量，有助于缓解护患矛盾，提高护理质量，同时也可对患者健康的恢复形成良性循环，降低患者并发症的发生，加速其术后康复，从而有利于医院病房的周转率，满足其他患者所需，同时也会为医院赢得更好的口碑，促进医院健康持续发展。

综上所述，U 型硅胶条覆盖的简易集尿器制作简单、方便、经济、有效，较传统的常规便盆具有明显优势，能减少了骨科创伤卧床患者住院时间及并发症的发生，提高护理满意度，有利于临床护理工作。

[参考文献]

[1] 罗敬. 创伤骨科下肢骨折手术围手术期深静脉血栓形成的预防与护理[J]. 中国疗养医学, 2023, 32(7):728-730.

[2] 朱丽萍, 苏严琳, 任玉娇, 等. 新型简易计量便盆的研制与应用[J]. 中华现代护理杂志, 2021, 27(26):3834-3834.

[3] 季建萍. 骨科护理中的人性化护理模式应用效果评价[J]. 中国煤炭工业医学杂志, 2024, 27(7): 1223-1226.

[4] 吴海云. 人性化服务在骨科护理中的应用价值[J]. 医学信息, 2022, 35(20):181-182.

[5] 朱宏. 不同训练方法对骨科术后患者拔出留置尿管后排尿功能的影响[J]. 航空航天医学杂志, 2022, 33(9).

[6] 刘勇红, 刘冬莲. 自制尿液报警器在颅脑损伤伴尿失禁患者中的应用[J]. 解放军护理杂志, 2023, 40(19):68-69.